

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**

**WILLIAN THOMAZ PEÇANHA**

**INFERÊNCIAS FILOGENÉTICAS DO GÊNERO *Oxymycterus* (CRICETIDAE:  
SIGMODONTINAE) DE ALGUMAS LOCALIDADES DO SUL DO BRASIL, COM BASE  
EM SEQUÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL**

**CURITIBA**

**2015**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**

**WILLIAN THOMAZ PEÇANHA**

**INFERÊNCIAS FILOGENÉTICAS DO GÊNERO *Oxymycterus* (CRICETIDAE:  
SIGMODONTINAE) DE ALGUMAS LOCALIDADES DO SUL DO BRASIL, COM BASE  
EM SEQUÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Genética (PPG-GEN), da Universidade Federal do Paraná, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Genética.  
Orientador: Prof. Dr. Thales Renato O. de Freitas (UFRGS)  
Co-Orientadora: Profa. Dra. Iris Hass (UFPR)

**CURITIBA**

**2015**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
DEPARTAMENTO DE GENÉTICA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA



## PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Banca Examinadora da Defesa de Dissertação de Mestrado, a qual se submeteu **WILLIAN THOMAZ PEÇANHA**, para obtenção do título de Mestre em Genética pela Universidade Federal do Paraná, no Programa de Pós-Graduação em Genética, são de parecer que se confira ao candidato o conceito "A".

Secretaria da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Genética do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná.

Curitiba, 27 de março de 2015

**Doutor Dahan Clemes Cardoso**  
Universidade Federal do Paraná – Membro Titular

**Doutor Ricardo Belmonte Lopes**  
Universidade Federal do Paraná – Membro Titular

**Doutor Thales Renato Ochotorena de Freitas**  
Universidade Federal do Paraná – Orientador e Presidente da Banca

Visto

**Prof. Dr. Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza**  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética

Prof. Dr. Ricardo Lehtonen R. de Souza  
Coordenador do PPG - GEN - UFPR  
Matrícula 176702

## AGRADECIMENTOS

A minha mãe, Cynthia, ao meu irmão, Vinícius (Vine) e a minha avó, Eurema Araci, minha total gratidão por tudo que já fizeram por mim. Obrigado por acreditarem em mim e me dar mais força a continuar, apoiando, financiando e aconselhando valiosamente nos momentos que mais precisei. Os amo imensamente! A todos meus primos, primas, avós, padrinhos, tios e tias, demais parentes que sempre torceram/patrocinaram/oraram por mim, meu agradecimento. Eu amo demais todos vocês. Ao meu tio-avô Vital Carlos Machado de Souza (tio Tal) e tia Antônia, pela confiança depositada, agradeço de coração. Obrigado Deus, Pai Celestial, pela vida e Família que tenho.

Aos meus amigos Thiago Vine (TV), Thauy, Rick, Thiago Possiede, Dudu, Geo, Toga, TH, Kako, a galera do Rotaract, a Amanda do Labinho, que me aguentaram, festejaram e dividiram as broncas (e as contas) da vida comigo, valeu galera!

A Profa. Dra. Lupe Furtado Alle e ao meu amigo (tio e colega de Pós), Benn Alle, pelo carinho, amizade e ajuda que ofertaram quando mais precisei, estão em meu coração e jamais esquecerei o que fizeram por mim, saibam disso.

Ao Prof. Dr. Thales Renato Ochotorena de Freitas, meu orientador, pelo suporte e apoio durante a execução deste trabalho no Rio Grande do Sul, Obrigado por acreditar em mim.

Ao Prof. Dr. Ives José Sbalqueiro, pelas conversas e sugestões valiosas, Obrigado.

Ao Dr. Fernando Marques Quintela, pela hospedagem em Porto Alegre, amizade e conhecimento construído ao longo desses anos, meu agradecimento.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa concedida para atuação exclusiva neste trabalho.

A Profa. Dra. Iris Hass, pelos anos me aguentando, ensinando, orientando e amizade. Se hoje faço parte deste ramo da Ciência, saiba que você foi a pessoa que abriu esta janela em minha vida. Muito Obrigado por me mostrar os Cricetídeos! Eles fazem parte da minha vida agora. Admiro seu conhecimento e espero chegar perto um dia.

E um agradecimento mais do que especial a Dra. Gislene Lopes Gonçalves, por toda sua paciência comigo, além de me ensinar e ajudar grande parte da minha dissertação. Admiro-a imensamente e espero um dia ser tão habilidoso como você, de coração muito obrigado!

Paranaguá! Cidade-Mãe, eu te adoro!

**Solta o Leão!**

"Parar. Parar não paro.  
Esquecer. Esquecer não esqueço.  
Se caráter custa caro  
pago o preço.  
Pago embora seja raro.  
Mas homem não tem avesso  
e o peso da pedra eu comparo  
à força do arremesso.  
Um rio, só se for claro.  
Correr sim, mas sem tropeço.  
Mas se tropeçar não paro  
não paro nem mereço.  
E que ninguém me dê amparo  
nem me pergunte se padeco.  
Não sou nem serei avaro  
se caráter custa caro  
pago o preço".

Sidônio Muralha

## RESUMO

O gênero *Oxymycterus* possui uma taxonomia bastante confusa, sendo relativamente mal entendido os reais limites entre as espécies, suas relações filogenéticas, distribuição e história natural. Algumas de suas espécies possuem ampla distribuição geográfica, ocorrendo em mais de uma formação fitofisionômica ou em mesmos biomas, geralmente em simpatria com congêneres de “distribuição restrita”.

Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo investigar a variabilidade haplotípica de gênero *Oxymycterus* no Brasil Meridional (Estados do PR, SC e RS), através do sequenciamento do gene mitocondrial citocromo *b* (*cyt b*) de 181 espécimes, utilizando também sequências disponíveis em banco de dados públicos (Genbank) como referência, com o intuito de investigar as potenciais espécies existentes na Região Sul. Apesar de a literatura relatar quatro táxons para o Sul do Brasil, a análise filogenética Bayesiana revelou a existência predominante de duas espécies na região (*O. nasutus* e *O. aff. quaestor*) e a inédita extensão de ocorrência de um táxon cuja distribuição na Mata Atlântica restringia-se até então a região Sudeste (*O. dasytrichus*). A inferência Bayesiana também revelou possíveis erros de informações depositadas em banco de dados, levando a conflitos de identificação de uma amostra entre *O. delator* e *O. amazonicus*, e identificando potencialmente uma espécie nova registrada para regiões de Cerrado no Oeste do Estado do Paraná.

Ainda de acordo com os resultados obtidos, *O. nasutus* e o “*O. quaestor*” são linhagens com marcada estruturação interna. *Oxymycterus nasutus* formou clados distintos, dentre eles, dois grupos exclusivos que pertencem ao Planalto Meridional e a Planície Costeira/RS. A linhagem de *O. quaestor* possui distribuição somente no Planalto Meridional, e também apresentou marcada divisão em dois clados, indicando a possível existência de espécies crípticas dentro deste grupo, cuja divergência genética superou a média interespecífica do gênero (> 6%). Essa informação é forte evidência de uma potencial espécie nova no Sul do Brasil, que ainda necessita revisão de caracteres morfológicos comparativos às demais linhagens próximas para robusta definição.

**Palavras-Chave:** Akodontini, Citocromo *b*, Filogenia Molecular, Sequenciamento

## ABSTRACT

Quite confusing taxonomy, being relatively misunderstood over the limits between species, phylogenetic relationships, and the natural history and distribution of the group, some species of *Oxymycterus* have wide geographical distribution, occurring in more than one phytophysognomic training or same biomes, usually with sympatric congeners "restricted distribution".

In this context, the present study aimed to investigate the haplotype variability *Oxymycterus* kind in southern Brazil (PR, SC and RS states), by sequencing the mitochondrial cytochrome *b* gene (cyt *b*) of 181 specimens, also using sequences available in public database (Genbank) as a reference, in order to investigate the potential species existing in the South. Although the literature report four taxa for the South Brazil, the Bayesian phylogenetic analysis revealed the existence of two predominant species in the region (*O. nasutus* and *O. aff. quaestor*) and the unprecedented extent of occurrence of a taxon whose distribution in the Atlantic Forest was restricted so far to Southeast (*O. dasytrichus*). The Bayesian inference also revealed possible error information deposited in the database, leading conflicts to identifying a sample of between *O. delator* and *O. amazonicus*, and potentially identifying a new recorded species to savannah regions in the west of Paraná.

Also according to the results obtained, *O. nasutus* and "*O. quaestor*" are markedly lines with internal structure. *Oxymycterus nasutus* formed distinct clades, including two exclusive groups belonging to the Southern Plateau and the Coastal Plain. The strain of *O. quaestor* has distribution only in the southern Plateau, and also showed marked division into two clades, indicating the possible existence of cryptic species within this group, whose genetic divergence exceeded interspecific average gender (> 6%). This information is strong evidence of a potential new species in southern Brazil, which still requires review of comparative morphological characters of other lineages to allow robust species definition.

**Keywords:** Akodontini, Cytochrome *b*, molecular phylogeny, Sequencing.

## SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS .....	VII
LISTA DE TABELAS.....	IX
1 INTRODUÇÃO.....	10
2. DESENVOLVIMENTO .....	11
2.1 ORDEM RODENTIA, Bromwich 1821 .....	11
2.3 FAMÍLIA CRICETIDAE, Rochebrune 1883.....	15
2.4 SUBFAMÍLIA SIGMODONTINAE, Wagner 1843.....	17
2.5 SURGIMENTO DA SUBFAMÍLIA SIGMODONTINAE .....	18
2.6 TRIBO AKODONTINI, Vorontzov 1959 .....	21
2.7 <i>Oxymycterus</i> Waterhouse, 1837.....	22
2.8 DNA MITOCONDRIAL.....	27
2.8.1 Citocromo <i>b</i> .....	29
2.9 ESTUDOS FILOGEOGRÁFICOS.....	30
2.9.1 Geomorfologia e Vegetação da Região Sul do Brasil .....	31
2.10 PROBLEMÁTICAS TAXONÔMICAS.....	33
3 JUSTIFICATIVA.....	37
4 OBJETIVOS.....	38
4.1 OBJETIVOS GERAIS .....	38
4.1.1 Objetivos específicos .....	38
5 MATERIAL E MÉTODOS .....	39
5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS .....	39
5.2 MÉTODOS.....	41
5.2.1 Extração de DNA.....	41
5.2.2 Quantificação do DNA.....	41



5.2.3 Amplificação do gene mitocondrial citocromo <i>b</i> .....	42
5.3 ANÁLISES DAS SEQUÊNCIAS .....	44
5.3.1 Análises Filogenéticas.....	44
6 RESULTADOS .....	45
6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS .....	45
6.2 ANÁLISE FILOGENÉTICA .....	47
6.3 DIVERSIDADE GENÉTICA E PARÂMETROS DE VARIABILIDADE INTRAESPECÍFICA.....	50
6.3.1 Parâmetros <i>Oxymycterus</i> aff. <i>quaestor</i> .....	50
6.3.2 Parâmetros <i>Oxymycterus nasutus</i> .....	55
6.3.3 Parâmetros <i>Oxymycterus dasytrichus</i> .....	60
6.3.4 Parâmetros <i>Oxymycterus</i> sp. ....	62
7. DISCUSSÃO.....	64
7.1 <i>Oxymycterus quaestor</i> X <i>Oxymycterus</i> aff. <i>quaestor</i> .....	64
7.2 <i>Oxymycterus nasutus</i> .....	69
7.3 <i>Oxymycterus dasytrichus</i> .....	72
7.4 <i>Oxymycterus</i> sp. ....	74
8 CONCLUSÃO .....	75
9 REFERÊNCIAS .....	77
10 ANEXOS.....	89
10.1 TABELA DE AMOSTRAGEM.....	89
10.2 ARTIGO CIENTÍFICO I.....	93
10.3 ARTIGO CIENTÍFICO II.....	114

## LISTA DE FIGURAS

- Figura 1.** Distribuição global de roedores Antártida e Nova Zelândia, assim como outras regiões não possuem estes táxons. Fonte: <http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520244061>\_\_\_\_\_ 12
- Figura 2.** Distribuição das espécies viventes e recentemente extintas de roedores através de suas famílias. Em destaque a família Muridae (azul) e Cricetidae (vermelha), compondo entre outras famílias a Superfamília Muroidea. Fonte: Wilson e Reeder (2005)\_\_\_\_\_ 13
- Figura 3.** Espécime de *Oxymycterus* sp. Foto: Fernando Marques Quintela\_\_\_\_\_ 23
- Figura 4.** Cariótipo padrão e complemento sexual de *Oxymycterus* sp. a) coloração convencional; b) Bandeamento C e c) Bandeamento G. (Conforme Sbalqueiro, 1989)\_\_\_\_\_ 24
- Figura 5.** Distribuição geográfica do gênero *Oxymycterus* proposto por Hershkovitz (1994), à esquerda, e a direita de Smith e Patton (1999)\_\_\_\_\_ 25
- Figura 6.** Distribuição das espécies do gênero *Oxymycterus* no Brasil (BONVICINO, 2008)\_\_\_\_\_ 26
- Figura 7.** Genoma mitocondrial de *Mus musculus* e disposição de genes de acordo com Gregorová *et al.* (2008)\_\_\_\_\_ 28
- Figura 8.** Disposição e possíveis combinações dos iniciadores do gene mitocondrial citocromo *b* em roedores Sul-americanos sigmodontíneos desenvolvidos por Smith e Patton (1999)\_\_\_\_\_ 30
- Figura 9.** Distribuição geográfica do sul do Brasil dos *Oxymycterus* coletados neste estudo. Pontos indicam a localidade de amostragem. Localidades dos pontos de referência estão na Tabela 4 \_\_\_\_\_ 39
- Figura 10.** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80 \_\_\_\_\_ 49
- Figura 11. (A)** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80. **(A1)** Em azul claro (negrito e itálico) as 59 amostras inferidas como relacionadas à linhagem *O. quaestor*, identificadas como clado 1 e clado 2 (*Oxymycterus* aff. *quaestor*) \_\_\_\_\_ 51
- Figura 12.** Distribuição do *Oxymycterus* aff. *quaestor* determinado pela inferência bayesiana ao longo do Planalto Meridional (inseridos na Mata Atlântica) no sul do Brasil. As referências de amostragem dos pontos (“a” – “q”) estão na Tabela 9 \_\_\_\_\_ 53
- Figura 13.** Rede de haplótipos construída utilizando o método *median-joining*, com base em sequências do cyt *b*, para os 59 indivíduos do grupo aff. *quaestor*. Cada círculo compreende um haplótipo e o seu tamanho é proporcional à frequência. Cada traço nas linhas que conectam os haplótipos representa um passo mutacional. As cores dos haplótipos correspondem a identificação dos haplótipos que foram inferidas utilizando a inferência Bayesiana. Em laranja o Clado 1; e Verde Clado 2 \_\_\_\_\_ 54
- Figura 14.** Mapa de distribuição geográfica do *Oxymycterus nasutus* ao longo do relevo Brasileiro (BONVICINO, 2008) \_\_\_\_\_ 55

**Figura 15. (A)** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80. **(A2)** Em vermelho (negrito e itálico) as 115 amostras inferidas como *Oxymycterus nasutus*\_\_\_\_\_ 56

**Figura 16.** Distribuição do *Oxymycterus nasutus* determinado pela inferência bayesiana ao longo do Planalto Meridional (inseridos na Mata Atlântica) e na Planície Costeira (no Pampa) no sul do Brasil. Os pontos em amarelo: as localidades com a presença de haplótipos da linhagem de Planalto, em azul: haplótipos da linha de Planície\_\_\_\_\_ 58

**Figura 17.** Rede de haplótipos construída utilizando o método *median-joining*, com base em sequências do *cyt b*, para os 115 indivíduos de *Oxymycterus nasutus*. Cada círculo compreende um haplótipo e o seu tamanho é proporcional à frequência. Cada traço nas linhas que conectam os haplótipos representa um passo mutacional. As cores correspondem a identificação dos haplótipos que foram inferidas utilizando a análise Bayesiana. Em amarelo os espécimes do Planalto Meridional, e em azul os espécimes de Planície Costeira\_\_\_\_\_ 59

**Figura 18.** Distribuição do *Oxymycterus dasytrichus* ao longo do território Brasileiro de acordo com Oliveira (1998)\_\_\_\_\_ 60

**Figura 19. (A)** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80. **(A3)** Em verde destacado em negrito e itálico as 6 amostras inferidas como *Oxymycterus dasythricus*\_\_\_\_\_ 61

**Figura 20.** Mapa de distribuição de *Oxymycterus dasytrichus* no sul do Brasil, de acordo com a Inferência Bayesiana. As localidades numeradas: 1- Guaraqueçaba/Índios (PR), 2- Guaraqueçaba/Massarapuã (PR), 3- Morretes/Marumbi e 4 – Itapoá (SC)\_\_\_\_\_ 62

**Figura 21.** Ponto amostral do *Oxymycterus* sp. (P495), única amostra coletada no Bioma do Cerrado (em laranja) presente neste estudo. Localidade de Jaguariaíva/Fazenda Chapada do Santo Antônio, no estado do Paraná\_\_\_\_\_ 63

## LISTA DE TABELAS

<b>TABELA 1.</b> Subordens da ordem RODENTIA listadas por MUSSER E CARLETON (2005)	13
<b>TABELA 2.</b> Espécies de <i>Oxymycterus</i> listadas por MUSSER e CARLETON (2005) e adaptadas a partir da literatura	26
<b>TABELA 3.</b> Grupos propostos por Oliveira (1998) *	35
<b>TABELA 4.</b> Pontos amostrais dos espécimes de <i>Oxymycterus</i> analisados, localidades amostradas, Bioma inserido, coordenadas geográficas (decimais)	40
<b>TABELA 5.</b> Média de distâncias genéticas observadas (K2P, expressa em %) entre os pares de haplótipos de <i>cyt b</i> de diferentes espécies de <i>Oxymycterus</i>	46
<b>TABELA 6.</b> Sequências parciais (743 pares de base) do gene mitocondrial citocromo b utilizadas na análise filogenética e comparações de distância genética no gênero <i>Oxymycterus</i> , obtidas a partir da base de dados de acesso público Genbank. Para todas as sequências são fornecidos o número de acesso e a correspondente referência	46
<b>TABELA 7.</b> Média de distâncias genéticas observadas (p expressa em %) entre os pares de haplótipos de <i>cyt b</i> de diferentes clados de <i>Oxymycterus</i> aff. <i>quaestor</i> , definidos através da inferência Bayesiana, sendo de distribuição exclusiva ao longo do Planalto Meridional, além de três sequências de <i>Oxymycterus quaestor</i> disponíveis Genbank	52
<b>TABELA 8.</b> Diversidade genética e resultados dos testes de neutralidade encontrados nos clados identificados e no grupo aff. <i>quaestor</i> como um todo	52
<b>TABELA 9.</b> Lista de haplótipos utilizados para construção da rede haplotípica do <i>Oxymycterus</i> aff. <i>quaestor</i> , assim como localidades (mostrados na Figura 12), e grupo no qual está inserido	53
<b>TABELA 10.</b> Diversidade genética e resultados dos testes de neutralidade encontrados nas linhagens identificadas como <i>O. nasutus</i> amostrados, de acordo com a distribuição geográfica	57
<b>TABELA 11.</b> Lista de haplótipos utilizados para construção da rede haplotípica do <i>O. nasutus</i> , assim como localidades (mostrados na Figura 16), e grupo no qual está inserido	57

## 1 INTRODUÇÃO

Os mamíferos de pequeno porte, em especial os roedores, apresentam uma ampla distribuição geográfica em todos os continentes (exceto Antártida e ilhas do Pacífico), e uma das mais complexas variações cariotípicas observadas nos vertebrados. Contudo, seus diversos rearranjos cromossômicos, ainda são na maioria das linhagens, pouco caracterizada, embora alguns grupos já possuam um cariótipo padrão definido. Porém, para algumas espécies, a citogenética não é um meio viável de identificação taxonômica, por causa da semelhança, tanto no seu número diploide, como nos padrões de bandas que os cromossomos apresentam, como, por exemplo, o gênero *Oxymycterus* ( $2n = 54$  e  $NF_A = 64$ ).

A utilização de marcadores moleculares, nestes casos, pode ser um meio eficaz de identificação e delimitação de espécies, em particular o uso de sequências de DNA mitocondrial (mtDNA). A vantagem do mtDNA como marcador é a frequência extremamente baixa de transposições, inversões, rearranjos e recombinação, permitindo a caracterização de linhagens filogenéticas sem a ambiguidade causada pela recombinação meiótica que ocorre nos genes nucleares. Além disso, a comparação de arranjos de genes mitocondriais tornou-se um meio para inferir relações evolutivas antigas, uma vez que os rearranjos parecem ser eventos únicos, geralmente raros, e que dificilmente surgem de forma independente em linhagens evolutivas distintas. Este trabalho consiste no sequenciamento do gene mitocondrial citocromo *b* (*cyt b*) em espécimes do gênero *Oxymycterus* coletados no Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) onde atualmente quatro espécies são reconhecidas com base em caracteres morfológicos, porém, de maneira questionável, devido à ausência de estruturas de diagnose conspícuas, ou seja, características determinantes para distinção de espécies. Devido a tal problemática taxonômica do grupo (e a ausência de limite entre as espécies), verificou-se a necessidade de avaliar a variabilidade genética ocorrente no sul do Brasil atribuída a diferentes espécies potenciais e estabelecer a distância genética intra e interespecífica para os táxons reconhecidos com base na morfologia. Para tal, amostras de diferentes localidades ao longo de toda a distribuição do Sul do Brasil foram incluídas, o que permitiu fazer inferências sobre a distribuição da variação genética das linhagens no espaço. Os resultados contribuem de forma significativa para a elucidação de um antigo e recorrente problema taxonômico nos roedores akodontíneos: o estabelecimento de limites conspícuos entre espécies utilizando ferramentas moleculares para delimitação.

## 2. DESENVOLVIMENTO


### 2.1 ORDEM RODENTIA, Bromwich 1821

A ordem Rodentia, compreende os roedores, a denominação deriva de *rodere*, palavra origem latina que significa roer. Tal nome é devido aos dentes incisivos proeminentes que crescem continuamente, pelo fato de não possuírem raízes, característica que todos os membros deste grupo compartilham. Estima-se que exista mais de 2.277 espécies viventes, o que perfaz aproximadamente 42% dos mamíferos do mundo (MUSSEY e CARLETON, 2005). Na América do Sul correspondem a 45% das espécies de mamíferos atuais (NOWAK, 1999).

Os roedores ocupam diversos ambientes terrestres que lhes forneçam condições de sobrevivência. Sua dieta é herbívora, carnívora ou onívora, existindo espécimes que consomem vegetais, insetos, pequenos invertebrados, fungos, peixes e inclusive outros mamíferos, entretanto, os hábitos alimentares deste grupo são predominantemente herbívoros (sementes, grãos, frutos, raízes e folhas) (MacDONALD, 1999). De adaptação ecológica excepcional, os roedores ocupam os mais diversos ambientes, de climas temperados e tropicais. Também podem ocupar regiões de maior revestimento florístico e nas mais estéreis; suportam grandes altitudes e em cada região podem mostrar um grande número de adaptações fisiológicas (SBALQUEIRO, 1989; MYERS, 2000). Porém, estão ausentes em regiões como a Nova Zelândia, Antártida, e ilhas oceânicas (Figura 1). Algumas de suas espécies são sinantrópicas, devido à ação antrópica em seus ambientes naturais, que quando prejudicados, os forçam a ocupar mesmas áreas urbanas (ALEXANDER, 2003; BRASIL, 2002; MYERS, 2000). Seus hábitos podem ser terrícolas, cursoriais, arborícolas, aquícolas, galerícolas, fossoriais, rupícolas e arvorícolas (MYERS, 2000).

A Ordem possui adaptações a diversos ambientes. Os roedores apresentam tamanho corporal e peso muito variados, entre 5 centímetros e 7 gramas na espécie *Micromys minutus* aos 1,3 metros de comprimento e 70 Kg como na capivara, *Hydrochoerus hydrochoerus* (MacDONALD, 1999). Com grandes variações demográficas, as populações de roedores apresentam altas taxas de reprodução e mortalidade e, em geral, o ciclo vital é curto. Apresentam diversas estratégias de reprodução e, em geral, os

roedores de maior porte reproduzem uma vez ao ano e os de menor mais de uma vez, mas isto ocorre em várias oportunidades ao longo de suas vidas (HICKMAN *et al.*, 2004).



**Figura 1.** Distribuição global de roedores. Antártida e Nova Zelândia, assim como outras regiões não possuem estes táxons. Fonte: <http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520244061>

De importância taxonômica para a Ordem Rodentia, os roedores apresentam um padrão de formula dental 1/1, 0/0, 0/0 e 3/3, mas que pode variar de acordo com grupo de 12 a 22 dentes, podendo apresentar dentes pré-molares. O gênero *Heliophobius* é exceção, pois apresenta 28 dentes (FELDHAMER *et al.*, 1999). Com forma de cinzel, possui quatro dentes incisivos, sendo dois superiores e dois inferiores com raízes abertas. Devido ao crescimento contínuo das raízes e superfície externa do incisivo mais rígido que a interna, explica a necessidade contínua em roer, a fim de provocar o seu desgaste (MacDONALD, 1999). Dentes caninos são inexistentes, e no lugar destes, possuem um local denominado diastema (uma espécie de espaçamento entre dentes incisivos e pré-molares) (NOWAK, 1999). Padrões de combinação de esmalte dental macio e esmalte dental duro são constantes em cada grupo, possuindo assim sua importância taxonômica (HICKMAN *et al.*, 2004).


Embasados por aspectos morfológicos e evidências moleculares Musser e Carleton (2005) propõe que a Ordem Rodentia tenha cinco Subordens, ilustrados na Tabela 1.

**TABELA 1.** Subordens da ordem RODENTIA listadas por MUSSER E CARLETON (2005):

Subordem	Nº Famílias	Nº Gêneros	Nº Espécies*	Exemplos
<b>Myomorpha</b>	7	323	1569	Ratos e camundongos
<b>Anomaluromorpha</b>	2	4	9	Falso-esquilo voador
<b>Castorimorpha</b>	3	7	102	Castores
<b>Hystricomorpha</b>	18	77	290	Capivaras e chinchilas
<b>Sciuromorpha</b>	3	61	307	Esquilos

\*Número de espécies conhecidas até esta revisão.

Embora a Subordem Hystricomorpha tenha o maior número de Famílias, a Subordem Myomorpha concentra a maior e mais conhecida diversidade do grupo, como as Famílias Muridae (em Azul) e Cricetidae (Vermelho) (Figura 2), perfazendo entre outras famílias a Superfamília Muroidea.



**Figura 2.** Distribuição das espécies viventes e recentemente extintas de roedores através de suas famílias. Em destaque a família Muridae (azul) e Cricetidae (vermelha), compondo entre outras famílias a Superfamília Muroidea. Fonte: Wilson e Reeder (2005).



## 2.2 SURGIMENTO DA ORDEM RODENTIA

Considerando a teoria clássica de surgimento e expansão, a Ordem Rodentia teria surgido, no final do Paleoceno, por volta de 56 milhões de anos atrás, na América do Norte, onde foram encontrados fósseis do *Paramys atavus*, representante da Família Ischyromyidae (Paramyinae). Posteriormente, teria se diversificado no Eoceno, no supercontinente Laurásia (América do Norte, Ásia e Europa), se expandindo pela Europa e Ásia no Eoceno inferior, assim posteriormente formaram grupos terrestres em faunas em todo o mundo (VAUGHAN, 1978; MELÉNLEZ, 1990; VAUGHAN *et al.*, 2000). Durante o Oligoceno, deu-se início a uma nova diversificação da ordem, surgindo novas famílias na América do Norte, Ásia e Europa e também, famílias próprias da África e América do Sul, como por exemplo, os caviomorfos na América do sul e os Phiomorpha na África, durante o Oligoceno Inferior (MELÉNLEZ, 1990; MacDONALD, 1999; HUCHON e DOUZERY, 2001).

A última grande diversificação da ordem se deu no Mioceno, originando a Família Muridae, sendo que neste período que ocorreu a diversificação das famílias atuais de roedores. Na América do Sul, a infra-ordem Caviomorpha fixou suas famílias atuais, levando em conta o isolamento da América do Sul durante o Mioceno com pouca troca faunística. Entretanto, foi no final do Mioceno e início do Plioceno em que ocorreram as maiores trocas faunística entre o Norte e o Sul do Continente Americano (REIG, 1987; HUCHON *et al.*, 2002). Estudos mais recentes, com base em marcadores moleculares, apontam que o surgimento dos grupos basais da Ordem Rodentia, assim como a divergência, é incoerente com as datas propostas em literaturas de base paleontológica (ADKINS *et al.*, 2001).

Kumar e Hedges (1998), baseados em divergências de sequências de proteínas, propõem que os ancestrais dos roedores teriam surgido por volta de 110 milhões de anos atrás, onde as duas subordens basais Sciuromorpha e Hystricomorpha teriam divergido. Porém, Adkins *et al.* (2001) a partir de dados moleculares nucleares e mitocondriais múltiplos, estima que os grupos Sciuromorpha e Hystricomorpha teriam divergido a 75 milhões de anos ainda no final do período Cretáceo.

Outra incompatibilidade é verificada quanto ao surgimento da subordem Myomorpha, grupo que compreende, entre outros, os gêneros *Rattus* e *Mus* (Família

Muridae). Os registros fósseis analisados por Flynn *et al.* (1986) apontam que os Murídeos (Muroidea) teriam surgido a 36 milhões de anos, outros autores como Jacobs e Pilbeam (1980), considerando aspectos fósseis e morfológicos, destacam que este grupo não tem mais que 14 milhões de anos para este grupo. Contudo, alguns autores, embasados em análises moleculares, discordam das datas propostas com base em fósseis. Kumar e Hedges (1998), por exemplo, verificam que o surgimento dos Muroidea se deu a 66,2 milhões de anos, com posterior diversificação de Cricetídeos e Murídeos a 65,8 milhões de anos. Considerando a diversificação do grupo do *Rattus/Mus* (Familia Muridae), Kumar e Hedges (1998), Huchon *et al.* (2000) e Adkins *et al.* (2001), propõem que grupos teria se diversificado a 40,7, 41,7 e 23 milhões de anos, respectivamente. Vale ressaltar que os autores utilizaram diferentes marcadores e/ou combinação de marcadores.

A incompatibilidade entre dados moleculares e morfologia é uma consequência da história evolutiva antiga de linhagens de roedores, sendo que estes dados se apresentam incoerentes devido a grandes lacunas fósseis dentre os mamíferos, e que apesar dos roedores terem um relógio molecular mais “acelerado” que os demais grupos, padrões de evolução molecular não são estáveis considerando diferentes grupos de mamíferos e marcadores selecionados (WU e LI 1985; FOOTE *et al.*, 1999). Apesar de se destacar como a Ordem que possui a evolução molecular mais acelerada da Classe Mammalia, possuindo uma taxa de evolução duas vezes mais rápida do que comparada a taxa de evolução de genes humanos (Li e Wu, 1987), as taxas de evolução molecular não são estáveis para todos os grupos desta Ordem. Assim, as taxas de diversificação, parecem não ter sido constantes no decorrer do tempo geológico e que ainda alguns grupos de roedores ainda sofrem mudanças significativas nas taxas de diversificação, tendo destaque a dois grupos: Sciuromorpha (clado dos Esquilos), e o Myodonta (Myomorpha), em especial as Famílias Cricetidae e Muridae (FABRE *et al.*, 2012).

### 2.3 FAMÍLIA CRICETIDAE, Rochebrune 1883

Os cricetídeos ocupam uma ampla variedade de habitats, abrangendo climas quentes, úmidos, frios e secos. Estes habitats incluem pastagens, prados, campos agrícolas, florestas, paisagens rochosas de montanhas, desertos, perímetros urbanos e

suburbanos, praias, lagos, lagoas, rios, mangues, pântanos e brejos, e inclusive regiões de elevada, a mais de 5.000 metros (NOWAK, 1999). Os membros desta Família podem viver solitários, em casais ou mesmo em bandos. Podem apresentar alta capacidade reprodutiva, quando há abundância de recursos e área disponível, elevando o número de indivíduos até que o ambiente se esgote, e então, migram a novas regiões (HASS, 2006). Podem ser carnívoros, onívoros ou herbívoros, variando sua dieta entre folhas, sementes, frutos, tubérculos, raízes, insetos, invertebrados terrestres e peixes. São predados por uma variedade de mamíferos carnívoros (como raposas, gatos e fuinhas), aves de rapina (como falcões, águias e corujas) e serpentes.

A presença de ectoparasitas é ocorrente na Família Cricetidae, podendo ser parasitados por ácaros e carrapatos (Acari), pulgas (Siphonaptera) e piolhos (Anoplura) (BARROS-BATTESTI *et al.*, 1998; WHITAKER *et al.*, 2007). Endoparasitas também podem ser verificados em Cricetídeos, como por exemplo, o platelminto do gênero *Schistosoma* (causador da esquistossomose), sendo os roedores *Holochilus brasiliensis* e *Nectomys squamipes* os hospedeiros (PICOT, 1992). Os roedores desta Família possuem uma importância médica, pois podem ser portadores de Hantavírus, um tipo viral que pode levar a síndrome pulmonar e cardiovascular. Na Europa e Ásia podem ser portados por *Myodes glareolus*, na América do Norte e Central pelas espécies *Peromyscus maniculatus*, *Oryzomys palustris* e *Sigmodon hispidus*, e na América do Sul pelos gêneros *Akodon*, *Oligoryzomys* e *Bolomys* (PINCELLI *et al.*, 2003; MULLER *et al.*, 2013). Jonsson *et al.* (2010) relata que roedores Sul Americanos também podem hospedar Arenavírus, um vírus que pode levar a febre hemorrágica. Os protozoários também podem se hospedar em Cricetídeos causando várias doenças em humanos como a Leishmaniose, causado pelo *Leishmania donovani*, hospedado no Cricetídeo *Calomys callosus* (MELLO e TEIXEIRA, 1984), doença de chagas pelo protozoário *Trypanosoma cruzi* hospedeiro em *Akodon montensis* e *Oxymycterus judex*, demonstrando que estes roedores sul-americanos podem ser reservatórios naturais de agentes causadores de doenças em humanos (OLIVEIRA *et. al*, 2005).

Na América do Sul, a família Cricetidae destaca-se, pois compreendem 55% das espécies de roedores sul-americanos, o que representa 22% das espécies de mamíferos de todo o subcontinente. No continente Americano, esta família divide-se em duas subfamílias principais: Sigmodontinae (usualmente denominados roedores Sul-

americanos) e Neotominae (roedores Norte-americanos), dicotomia utilizada esta por razões fenéticas e filogenéticas (REIG, 1984), além da presença das subfamílias Arvicolinae, na América do norte, e Tylominae, principalmente distribuídos na América central.

Wilson e Reeder (2005) descrevem a família abrangendo 130 gêneros e 681 espécies, distribuídas em seis subfamílias: Arvicolinae, Cricetinae, Lophiomyinae, Neotominae, Sigmodontinae e Tylominae.

Autores como Marshall (1979) e Reig (1984) corroboram a ideia que há pelo menos sete milhões de anos os membros da família Cricetidae teriam se diversificado a partir de um ancestral norte-americano, porém estes autores se baseiam em dados fósseis.

## 2.4 SUBFAMÍLIA SIGMODONTINAE, Wagner 1843

Os roedores da subfamília Sigmodontinae ocupam diferentes habitats e possuem diversos estilos de vida como semi-aquáticos, fossoriais, semi-fossoriais, cursoriais, semi-arborícolas e arborícolas (EMMOS e FEER, 1997). A variação nos modos de vida é decorrente da evolução de sua morfologia e adaptações a ambientes (CAMARGO *et al.*, 2008). A subfamília Sigmodontinae é extremamente diversificada e tem uma ampla distribuição geográfica nas Américas, da Terra do Fogo ao sul dos Estados Unidos. Os sigmodontíneos também habitam o arquipélago das Ilhas Galápagos e de algumas das Antilhas (por exemplo: Curaçao e Jamaica), embora a grande maioria do grupo seja distribuída na América do Sul continental. Apenas dois gêneros não são verificados na porção continental Sul-americana; o gênero *Rheomys* que se limita a América central, e o *Nesoryzomys* são de ocorrência endêmica para as Ilhas Galápagos (PARDIÑAS *et al.*, 2002).

Possuindo 86 gêneros existentes e aproximadamente 400 espécies, a subfamília Sigmodontinae é um dos mais diversos e complexos grupos de mamíferos (PARADA *et al.* 2013; VENTURA *et al.*, 2013; D'ELÍA, 2003). Esta subfamília está representada por nove tribos: Oryzomyini (a maior), Akodontini, Sigmodontini, Ichthyomyini, Thomasomyini, Wiedomyini, Phyllotini, Reithrodontini e Abrotrichini (D'ELIA *et al.*, 2007).

Musser e Carleton (2005), em sua revisão da sistemática da Ordem Rodentia, desconsideram a existência da tribo Abrotrichini, incluindo os gêneros *Abrothrix*,

*Chelemys*, *Geoxus*, *Notiomys* e *Pearsonomys* na tribo Akodontini. Porém Smith e Patton (1999), baseados em análises filogenéticas através de dados moleculares de sequenciamento do gene mitocondrial citocromo b (cyt b), assim como D'Elia *et al* (2007), baseado em dados mitocondriais (cyt b) e nucleares (IRBP) apontam que estes 5 gêneros compõe uma tribo Andina (Abrotrichini) e de distribuição exclusiva pela Cordilheira dos Andes. Esta subfamília é corroborada por vários autores como um grupo monofilético (ENGEL *et al.*, 1998; SMITH e PATTON, 1999). Porém as relações filogenéticas internas e entre as tribos desta subfamília ainda é controversa.

Trabalhos recentes envolvendo os roedores Neotropicais da subfamília Sigmodontinae, em especial a tribo Oryzomyini, utilizando marcadores moleculares e/ou morfológicos elucidam as relações nesta tribo, e inclusive propondo rearranjos e inclusive novas espécies dentro desta tribo (BONVICINO e MOREIRA, 2001; WEKSLER, 2006<sup>ab</sup>). Além disso, existem ainda controvérsias de rearranjos taxonômicos propostos para sigmodontíneos entre marcadores nucleares e mitocondriais (WEKSLER, 2003; SMITH e PATTON, 1999).

## 2.5 SURGIMENTO DA SUBFAMÍLIA SIGMODONTINAE

Existem diversas hipóteses para o surgimento da subfamília Sigmodontinae na América do Sul.

A hipótese mais antiga é a de Simpson (1950) corroborada por Patterson e Pascual (1972) e Baskin (1978) que relata que os Sigmodontinae são táxons de recente invasão na América do Sul, e que sua diversificação aconteceu na América do Norte em suas regiões tropicais, ocorreu antes da migração para América do Sul. Durante o Plioceno, à três milhões de anos, os elementos invasores atravessaram a ponte panamenha. Esta hipótese possui alguns pontos ao seu favor, como por exemplo, a presença dos Phyllotini na América do Norte durante o Mioceno e a presença de fósseis de Sigmodontinae a partir da formação Chapadmalalense na América do Sul no Plioceno superior.

Outra teoria foi postulada por Hershkovitz (1966, 1972), Savage (1974) e corroborada por Reig (1975, 1980, 1981, 1984, 1987), que devido ao forte endemismo dos Sigmodontinae e extenso padrão de diversificação, indica que a diferenciação foi localmente na América do Sul, a partir de uma linhagem que migrou durante o início do

Mioceno. Com isso os Sigmodontinae já fariam parte da antiga fauna da América do Sul, e assim estando no Subcontinente, se diversificaram na maioria de gêneros e espécies atuais. Provavelmente os ancestrais teriam migrado da América do Norte pelo extremo noroeste via meio transaquático, antes mesmo do estabelecimento da Ponte Panamenha. Para sustentar esta hipótese Reig (1987) encontrou fósseis de Sigmodontinae em Montehermosense, em estratos mais velhos. Tais fósseis são muito semelhantes aos espécimes atuais, levando a acreditar, que a quatro milhões de anos os Sigmodontinae já haviam se diferenciado. Outra razão é a tribo Oryzomyini que possui vários caracteres primitivos, levando a considerar que vieram da América do Norte durante o Oligoceno.

Segundo a teoria de Marshall *et al.* (1979), a migração Sul-americana, dos Sigmodontíneos, teria ocorrido pela América Central, a 6 milhões de anos, devido à baixa no nível do mar, conectando a América do Norte com o continente Sul-americano, reduzindo a barreira marinha. Provavelmente o ancestral fundador seria adaptado a ambientes florestais, e a partir de sua dispersão, teria acessado ambientes de pastagens (Cerrados/Savanas e pradarias) se adaptando a habitats cursoriais, permanecendo assim até 3,5 milhões de anos. Com a primeira glaciação, os ambientes florestais foram reduzidos, em contrapartida, ambientes como pradarias e savanas foram ampliados, assim através de um corredor destes ambientes ampliados, na porção oriental da cordilheira dos Andes se dispersaram por toda as savana-pradarias da Bolívia e Argentina, que anterior a este evento não eram conectadas.

Segundo Reig (1987) a hipótese de Simpson (1950) corroborada por outros autores são errôneas, pois a diversidade é maior na América do Sul do que na América do Norte e Central. O autor também rejeita a hipótese de Marshall *et al.* (1979), já que existem dados para suportar que a diferenciação dos Sigmodontinae não aconteceu nas Savanas do Norte do Subcontinente, e sim na Região Andina, já que 87% dos Sigmodontinae são representados pelas tribos Oryzomyini, Akodontini e Phyllotini e possuem distribuição Andina. Reig (1984, 1987) ressalta este ponto, pois o eixo de dispersão dos Sigmodontinae ocorreu nos Andes.

A tribo Oryzomyini é a que mais possui caracteres craniodentários mais primitivos (plesiomórfica). Alguns autores relacionam esta tribo com os Cricetodontinae durante o Oligoceno na América do Norte. Esta tribo possui algumas características dos Cricetodontinae, pois habitam selva orófila e dieta onívora e/ou insetívora. Além disso,

esta tribo apresenta um elevado número de gêneros no Norte dos Andes, indicando, segundo Reig (1984), o local de diferenciação dos Sigmodontinae, e que a partir deste local houve a diversificação da subfamília Sigmodontinae.

A região Norte dos Andes sofreu uma constante orogenia durante o Eoceno, Mioceno, Plioceno e Paleoceno (VAN DER HAMMEN, 1961), o que resultou numa diversificação de ambientes, que propiciou uma diferenciação dos Oryzomyini ancestrais impulsionando a adaptação aos mais diferentes ambientes. Mais tarde, com a diferenciação dos Sigmodontinae primitivos (Oryzomyini) surgiria uma nova tribo, a Akodontini.

Entretanto, D'Elia (2000) ressalta que a maioria dos pesquisadores desta subfamília determina sua origem nos históricos biogeográficos da América do Sul e, consequentemente, compartilham a ideia que um ancestral Norte/Central Americano teria dado origem aos roedores Sul-americanos. Porém o autor argumenta que existem questões não resolvidas da origem geográfica da linhagem Sigmodontinae, e que os novos centros de discussão abrangeriam duas questões distintas: a) o tempo que os roedores sigmodontíneos entraram na América do Sul; e b) o grau de diferenciação do grupo invasor. Por exemplo: Se houve apenas um “protosigmodontíneo” fundador (grupo estoque Oryzomino) e/ou diferenciados sigmodontíneos se introduziram no subcontinente.

Hershkovitz (1972) discute esta última questão, em que roedores vindos da África também poderiam ser fundadores dos roedores da América do Sul, assim como Marshall (1979) e Reig (1984) propõe que em algum momento outros grupos podem ter vindo da América Central e/ou do Norte após a conexão do continente Sul-americano e Norte-americano pela ponte do Panamá, e com isso poderia explicar a complexidade dos arranjos taxonômicos deste grupo.

Porém Engel *et al.* (1998), apesar de concordar com os eventos histórico-geográficos propostos por Marshall (1979), como a ponte Panamenha e elevação dos Andes, discordam das datas propostas. Baseados na distribuição geográfica do grupo, estimativas de relógio moleculares e eventos geológicos do subcontinente levantam duas hipóteses. A primeira, que caso fora um único grupo fundador, a migração teria ocorrido entre 9 e 14,9 milhões de anos, por um grupo estoque oryzomino, e caso tenha ocorrido a introdução de diferentes grupos no continente, entre 7,6 e 12,5 milhões de anos. Embora as duas hipóteses corroborem que a irradiação dos sigmodontíneos por toda a América

do Sul tenha ocorrido entre 5 e 8,3 milhões de anos, principalmente pelos grupos Akodontini, Abrotrichines e Phyllotines, a data de surgimento dos Oryzomyines ainda é incerta, podendo ser anterior e fundadora, ou mesmo contemporânea aos outros grupos emergentes.

Engel *et al.* (1998) e Smith e Patton (1999), em seus estudos utilizando marcadores moleculares, apoiam fortemente a monofilia dos Sigmodontíneos e consideram a radiação do grupo como um processo a partir de 10-14 milhões de anos apoiando a ideia que a invasão dos roedores para a América do Sul ocorreu antes das datações apontadas pela literatura, baseada apenas em eventos geológicos e fósseis.

Entretanto considerando apenas a tribo do presente estudo, tribo Akodontini, que possui uma ampla distribuição geográfica Sul-americana, com concentração de seus respectivos táxons na área central da cordilheira dos Andes, e é considerada por Reig (1987) o local de diferenciação dos akodontinos. Autores propõem que a tribo seja monofilética e derivada evolutivamente de um Oryzomino primitivo (GARDNER e PATTON, 1976; BIANCHI *et. al.*, 1971; REIG, 1984). Análises cladísticas com base em sequencias de DNA mitocondrial e nuclear, em representantes da subfamília Sigmodontinae, corroboram a monofilia da tribo Akodontini (D'ELÍA, 2003). Entretanto, a hipótese que os akodontinos teria evoluído a partir de um estoque oryzomino, e em sequencia dado origem aos filotinos, é refutada pelo autor, que embasado em seus resultados, propõe que os filotinos e oryzominos sejam distantes do clado relacionado aos akodontinos. Sendo tais resultados concordantes com aos de Engel *et al.* (1998).

## 2.6 TRIBO AKODONTINI, Vorontzov 1959

A tribo Akodontini possui 35% da diversidade de espécies existentes entre as tribos da subfamília Sigmodontinae de roedores da América do Sul, embora as relações de gêneros e espécies dentro desta tribo sejam imprecisas (SMITH e PATTON, 1993). Com 14 gêneros, distribuídos em 106 espécies, a tribo Akodontini é a segunda maior tribo da subfamília Sigmodontinae, porém, ainda são controversas as relações taxonômicas deste grupo (SMITH e PATTON, 1999; MUSSER e CARLETON, 2005; D'ELIA *et al.* 2007), sendo os gêneros desta tribo: *Akodon*, *Bibimys*, *Blarinomys*, *Brucepattersonius*, *Deltamys*,



*Juscelinomys*, *Kunsia*, *Necomys*, *Notiomys*, *Oxymycterus*, *Podoxymys*, *Scapteromys*, *Thalpomys* e *Thaptomys*.

A tribo Akodontini é uma das mais diversas dos sigmodontíneos, apenas não sendo maior que a diversidade da tribo Oryzomyini. O grupo é morfologicamente variado e amplamente distribuído na América do Sul, com exceção da Amazônia, ocupa uma variedade de habitats, tanto de terra firme e de várzea. Ecologicamente, os akodontinos também são um grupo diversificado, com amplitude de dietas, incluindo espécies fossoriais, semi-aquática e cursoriais (PARDINÃS *et al*, 2002).

Nesta Tribo destaca-se a grande variabilidade cariotípica, ocorrendo espécies com número diplóide variando entre  $2n=10$  (*Akodon* sp.) até  $2n=70$  (*Bibimys labiosus*) e número de braços dos cromossomos autossômicos com variação entre  $NF_A = 14-16$  (*Akodon* sp.) a  $NF_A = 80$  (*Bibimys labiosus*) (SBALQUEIRO, 1989; SILVA e YONENAGA-YASSUDA, 1998, GONÇALVES *et al.*, 2005). Outro destaque da tribo são as variações nos tipos de sistemas sexuais, sendo um exemplo o gênero *Deltamys*, que apresenta um sistema sexual múltiplo ( $X_1X_1X_2X_2/X_1X_2Y$ ), único em sua tribo devido a uma translocação Y-Autossomo (SBALQUEIRO *et al.*, 1984).

A proposta de Liascovich e Reig (1989) para a dispersão desta tribo no continente sugere que a radiação desta tribo ocorreu com três linhagens de akodontinos ao longo da América do Sul, a partir do centro de origem das espécies de akodontinos (região central da Cordilheira dos Andes), com destaque para a dispersão ao gênero *Akodon*. Dentre as três linhagens, uma teria migrado e se diversificado ao longo do Sul dos Andes, mantendo o  $2n = 52$  ancestral, quase inalterado. Outra linhagem teria migrado ao norte do continente Sulamericano, se diversificando ao longo dos Andes Central e Norte, resultando na variante cariotípica (número diploide) no  $2n = 18$  de *A. urichi* da Venezuela, e a ultima e maior radiação seria a Centro-Sul, ao longo do Chaco e Pampas, que teria originado os cariótipos com  $2n = 40$  a  $44$ , que foram gradativamente reduzidos por eventos de fusão, dando origem aos cariótipos com  $2n = 24$ ,  $16$  e  $14$ , observados no Nordeste e Centro-Sul do Brasil.

## 2.7 *Oxymycterus* Waterhouse, 1837

O gênero *Oxymycterus* (também chamado de “Hocicudo”, por pesquisadores de idioma hispânico ou de “Rato-do-Brejo” vulgarmente no Brasil) compreende roedores

considerados de porte pequeno a grande, com o comprimento do corpo variando em média de 109 a 180 mm, e cauda menor que o do corpo, de 73 a 140 mm (Figura 3). Apresentam pelagem macia e longa, com coloração dorsal cinza-escuro a castanho-avermelhada, com ventre mais claro (HERSHKOVITZ, 1994; BONVICINO, 2008). Sem limite definido com o dorso, a coloração do ventre deste gênero, varia nas espécies de amarelo-acinzentado-escuro a laranja-escuro, possuindo quatro pares de mamas. A superfície superior das patas é revestida de pêlos curtos escuros. As orelhas são também recobertas por pêlos curtos escuros, mais escassos na superfície externa, embora algumas espécies tenha a pelagem fortemente tracejada de preto (BONVICINO, 2008).


A característica mais evidente no gênero são garras bem desenvolvidas e focinho longo, cauda geralmente pouco pilosa e com as escamas aparentes, pêlos ungueais (próximo às patas) escuros e escassos (BONVICINO, 2008).



**Figura 3.** Espécime de *Oxymycterus* sp. Foto: Fernando Marques Quintela

A grande maioria das espécies de *Oxymycterus* apresenta  $2n = 54$  e  $NF_A = 64$ , em geral, o cariótipo do gênero é constituído por 6 pares de cromossomos metacêntricos ou submetacêntricos (um par submetacêntrico grande, três pares de metacêntricos médios e dois pares de pequenos metacêntricos), 20 pares cromossômicos acrocêntricos de tamanho variável, e cromossomos sexuais submetacêntrico e acrocêntrico, sendo X e Y


respectivamente (Figura 4) (SBALQUEIRO, 1989; SVARTAMAN e ALMEIDA, 1993; HERSHKOVITZ, 1998; BONVICINO *et al.*; 2005).



**Figura 4.** Cariótipo padrão e complemento sexual de *Oxymycterus* sp. a) coloração convencional; b) Bandeamento C e c) Bandeamento G. (Conforme Sbalqueiro, 1989).

Segundo SBALQUEIRO (1989), diferentes espécies e subespécies de *Oxymycterus* mostram uma constância em seus números diplóides ( $2n = 54$ ), podendo, no entanto, variar o número de braços autossômicos ( $NF_A = 64$  a  $60$ ), devido a presença ou ausência de quatro cromossomos metacêntricos pequenos e também a presença de cromossomos X com morfologias submetacêntricas e subtelocêntricas, além de machos variando o cromossomo Y em acrocêntricos e metacêntricos. Svartman e Almeida (1993),

também encontraram esta constância ( $2n = 54$ ) em espécimes coletados na região central do Brasil. O gênero possui uma ampla distribuição na América do Sul, onde habitam bordas de mata em formações florestais e áreas abertas, veredas e campos de altitude no Cerrado, área periférica da Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Caatinga, onde está restrito às regiões mais férteis, frequentemente nas chapadas e bases de serras (HERSHKOVITZ, 1994) (Figura 5).




**Figura 5.** Distribuição geográfica do gênero *Oxymycterus* proposto por Hershkovitz (1994), à esquerda, e a direita de Smith e Patton (1999).

O gênero ainda caracteriza-se por possuir uma dieta insetívora (cupins e demais insetos) e com caracteres morfológicos adaptados de habito terrestre e semi-fossorial. Podem adotar hábitos de predação consumindo vermes como observado em marsupiais dos gêneros *Philander* e *Metachirus* (CARLETON, 1973; HERSHKOVITZ, 1994; BONVICINO, 2008).

São descritas 16 espécies do gênero *Oxymycterus* (MUSSER e CARLETON, 2005), sendo a primeira descrita por Félix Azara em 1801. Entretanto, Hershkovitz (1994) reconhece 23 formas de *Oxymycterus* distribuídas ao longo do continente Sul-americano. De acordo com o arranjo taxonômico proposto por Oliveira (1998, Adaptado) ocorrem no

Brasil: *Oxymycterus amazonicus*, *O. caparaoe*, *O. dasytrichus*, *O. delator*, *O. inca*, *O. judex*, *O. nasutus*, *O. quaestor* e *O. rufus* (Figura 6).



**Figura 6.** Distribuição das espécies do gênero *Oxymycterus* no Brasil (BONVICINO, 2008).

Devido a conflituosas classificações de distribuição e recorrentes relatos de espécies sinônimas das espécies do gênero *Oxymycterus*, a Tabela 2 aqui proposta, lista a partir da ultima revisão geral do gênero (MUSSE e CARLETON, 2005), todas as espécies consideradas válidas para o gênero, e foi adaptada, para contemplar espécies recentemente descritas e referenciadas como existentes a partir da literatura. (JAYAT *et al.*, 2008; HOFFMAN *et al.*, 2002; HERSHKOVITZ, 1994; HERSHKOVITZ, 1998).

**TABELA 2.** Espécies de *Oxymycterus* listadas por MUSSE e CARLETON (2005) adaptada a partir da literatura:

<b>Espécie</b>	<b>Autor, ano</b>
<i>Oxymycterus nasutus</i>	Waterhouse, 1837
<i>Oxymycterus akodontius</i>	Thomas, 1921
<i>Oxymycterus amazonicus</i>	Herskovitz, 1994
<i>Oxymycterus angularis</i>	Thomas, 1909
<i>Oxymycterus caparaoe</i>	Herskovitz, 1998
<i>Oxymycterus dasytrichus</i>	Fischer, 1814
<i>Oxymycterus delator</i>	Thomas, 1903
<i>Oxymycterus hiska</i>	Hinojosa, Anderson & Patton, 1987
<i>Oxymycterus hispidus</i>	Pictet, 1843
<i>Oxymycterus hucucha</i>	Hinojosa, Anderson & Patton, 1987

<i>Oxymycterus inca</i>	Thomas, 1900
<i>Oxymycterus paramensis</i>	Thomas, 1902
<i>Oxymycterus quaestor</i> *	Thomas, 1903
<i>Oxymycterus roberti</i>	Thomas, 1901
<i>Oxymycterus rufus</i>	Fischer, 1814
<i>Oxymycterus judex</i>	Thomas, 1909
<i>Oxymycterus wayku</i> *	Jayat, 2008
<i>Oxymycterus josei</i>	Hoffman, Lessa & Smith, 2002
<i>Oxymycterus misionalis</i> *	Sanborn, 1931
<i>Oxymycterus juliacae</i> *	Allen, 1900
<i>Oxymycterus nigrifrons</i> *	Osgood, 1944

---

\* Espécies não listadas na revisão de Musser e Carleton (2005).

De ocorrência na região Sul, de acordo com Bonvicino (2008), são conhecidas quatro espécies:

- *Oxymycterus delator* Thomas, 1903, descrita para Supacaí, departamento de Paraguari, Paraguai, ocorre no leste do Paraguai e no Brasil, nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais Bahia, Piauí e Ceará (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006).

- *Oxymycterus judex* Thomas, 1909, de Joinville, Santa Catarina, distribui-se pelo litoral e serras, do norte do Estado do Rio Grande do Sul ao Estado de São Paulo, e pelo interior dos Estados de Santa Catarina e Paraná, da margem esquerda do rio Paraná, até a divisa com São Paulo (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006).

- *Oxymycterus nasutus* Waterhouse, 1837, cuja localidade-tipo é Maldonado, Uruguai, ocorre também no Brasil do Rio Grande do Sul, onde ocorre desde o nível do mar até altitudes elevadas da Serra Geral, à Santa Catarina e Paraná, onde está restrito às altitudes elevadas das montanhas costeiras (OLIVEIRA, 1998).

- *Oxymycterus quaestor* Thomas, 1903, com registro apenas para a localidade-tipo, Roça Nova, na Serra Geral, Estado do Paraná (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006).


## 2.8 DNA MITOCONDRIAL

Além do genoma nuclear, os Eucariotos possuem também um genoma organelar, independente do nuclear, denominado DNA mitocondrial (DNAMt), e está presente nas mitocôndrias (MARGULIS, 1981; GRIVELL, 1983). O DNAMt compreende uma cadeia de DNA circular fechado que codifica proteínas envolvidas na maquinaria de fosforilação



oxidativa (SARASTE,1999). Entretanto este DNA é herdado independentemente do genoma nuclear e, constituem um tipo de herança característico denominada herança extranuclear (maternal) (HAUSWITH e LAIPIS, 1986). O genoma mitocondrial é haploide e, em geral, é constituído, por uma dupla fita circular entre 15.000 e 17.000 pares de bases de comprimento, estando presente desde centenas a milhares de cópias por célula (LI e GRAUR, 2000). Possui 37 genes funcionais sem longos espaços intergênicos. Estes *loci* codificam 22 RNA de transferências (RNAt), dois RNA ribossômicos (RNAr) e 13 RNA mensageiros (RNAm) para a síntese de subunidades de proteínas específicas envolvidas na fosforilação oxidativa e no transporte de elétrons, e em geral é bem conservado em mamíferos (AVISE, 2000).

Em camundongos (*Mus musculus*), Gregorová *et al.* (2008) determina que o DNA mitocondrial nesta espécie tenha em torno de 16.300 pb (Figura 7).



**Figura 7.** Genoma mitocondrial de *Mus musculus* e disposição de genes de acordo com Gregorová *et al.* (2008).

O DNA mitocondrial (mtDNA) possui uma rápida evolução, sendo um excelente marcador para o estudo de diferenciações genéticas recentes por acumular substituições de base, inserções e deleções com uma taxa média de cinco a dez vezes mais rápida que o DNA nuclear cópia simples (BROWN *et al.*, 1979). Outra vantagem do mtDNA como marcador para estudos de diferenciações genéticas recentes, é a frequência extremamente baixa de rearranjos (tais como transposições, inversões) e recombinação devido a inexistência de um material genético homólogo, o que permite a caracterização de linhagens filogenéticas sem a ambiguidade causada pela recombinação meiótica que ocorre nos genes nucleares (BOORE, 1999). Avise (2000) destaca as hipóteses da rápida evolução do mtDNA devido a ineficiência do sistema de reparo levando a altas taxas de mutação, pela inexistência de histonas (empacotamento) e pelo relaxamento das limitações funcionais. Entretanto, as regiões do genoma mitocondrial evoluem em diferentes taxas, o que permite escolhas específicas, dependendo das questões a serem abordadas. Regiões como o citocromo *b* (cyt *b*), citocromo oxidase I (COI) e região controladora (*d-loop*), sendo esta última dividida em dois segmentos alvos (*HVS 1* e *HVS 2*), são geralmente utilizadas em estudos de variabilidade genética e filogenia molecular.


### 2.8.1 Citocromo *b*

O citocromo *b* (cyt *b*) é um gene mitocondrial responsável por codificar a apoenzima citocromo *b* (Cob), que tem o papel de transportar os elétrons dos hidrogênios gradativamente, permitindo a liberação gradativa de energia que está presente na cadeia respiratória (BOORE, 1999). Em roedores, há pequenas diferenças no comprimento deste gene em diferentes grupos, em Arvicolinae, é de 1143 pb e em alguns Murinae o gene possui 1144 pb de comprimento. Em alguns exemplares de Hystricognathi (Hystricomorpha), o gene possui 1143 pb, mas em muitos outros roedores, o gene é mais curto em um códon na extremidade (MÁRTIN *et al.*, 2000).

A vantagem da inclusão do citocromo *b*, em análises é que, por ser um marcador frequentemente utilizado em estudos filogenéticos, existindo estimativas de taxas de evolução específicas para diferentes grupos animais, permitindo assim uma maior confiabilidade nas estimativas de tempos de divergência entre populações e suas



correlações com os eventos que influenciaram sua história evolutiva (SOUZA, 2008). Devido a sua ampla utilização, ganhou destaque como marcador universal, especialmente em estudos com roedores Sulamericanos (SMITH e PATTON, 1999; WEKSLER, 2006<sup>B</sup>; BONVICINO e MOREIRA, 2001; PARDIÑAS *et al.*, 2005; D'ELÌA e PARDIÑAS, 2004; D'ELÌA, 2003; D'ELÌA *et al.*, 2008). A Figura 8 além de mostrar a extensão deste gene, mostra os iniciadores (*primers*) comerciais desenvolvidos por Smith e Patton (1993) para a amplificação deste em roedores, e em especial, aos roedores Neotropicais (Sigmodontinae).



**Figura 8.** Disposição e possíveis combinações dos iniciadores do gene mitocondrial citocromo *b* em roedores Sul-americanos sigmodontíneos desenvolvidos por Smith e Patton (1999).

## 2.9 ESTUDOS FILOGEOGRÁFICOS

Os estudos filogeográficos se caracterizam por associar biogeografia, genética populacional e filogenia molecular em estudos de polimorfismos de genes em populações de uma espécie ou entre espécies próximas (AVISE *et al.*, 1987). Abordagens de comparativos filogeográficos são valiosos para desenvolver e testar hipóteses de processos evolutivos históricos com impacto na composição da biodiversidade. As técnicas e métodos que utilizam DNA são eficazes para reconstrução filogenética e têm sido empregadas com frequência em várias abordagens evolutivas, tais como nos estudos de fluxo gênico, especiação, estruturação e sistemática de populações (AVISE, 1994).

Recentemente, alguns trabalhos, contemplando o tema, têm sido desenvolvidos em alguns gêneros e/ou espécies de roedores Sulamericanos, em especial, a Subfamília Sigmodontinae (RODRIGUEZ-SERRANO *et al.*, 2006; MIRANDA *et al.*, 2009; COSTA *et al.*, 2011; ALARCÓN *et al.*, 2011; PALMA *et al.*, 2012; VENTURA *et al.*, 2013).

Os primeiros estudos Filogeográficos da Tribo Akodontini foram realizados por Geise *et al.* (2001). Analisando 801 pb do citocromo *b*, os autores realizaram inferências sobre seis espécies do gênero *Akodon* do leste da América do Sul. Posteriormente Montes *et al.* (2008), Ventura *et al.* (2012) e Valdez e D'Elía (2013) realizaram estudos filogeográficos nas espécies *Deltamys kemp*i, *Blarinomys beviceps* e *Akodon montensis*, respectivamente. Contudo, Miyaki (2009) ressalta que estudos filogeográficos da fauna brasileira ainda são escassos face à diversidade, e que provavelmente ainda existam muitas novas linhagens a serem descritas, e que padrões gerais de distribuição e diferenças entre linhagens podem ser revistos.

### 2.9.1 Geomorfologia e Vegetação da Região Sul do Brasil

Ab'Saber (1969) classificou o relevo brasileiro em dois tipos de macro unidades geomorfológicas: Planaltos e Planície. Entretanto, o autor argumenta a existência de três padrões geomorfológicos para a região Sul do Brasil; o Planalto Meridional, Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense e a Planície Costeira/RS.

O Planalto Meridional é dominado por terrenos sedimentares recobertos parcialmente por lavas vulcânicas (basalto), e na região Sul do Brasil se estende desde o Estado do Paraná ao Norte do Rio Grande do Sul (AB'SABER, 1969). É Subdivido em quatro padrões morfológicos principais: Planalto Atlântico, Planalto dos Campos Gerais, Planalto Arenítico-Basáltico e Depressão Periférica (MAACK, 1947). Sob o Planalto Meridional da região Sul do Brasil, está inserida a Mata Atlântica (Bioma), e segundo Pillar *et al.* (2009) os ecossistemas florestais da região sul do Brasil é a Floresta Ombrófila Densa - FOD, Floresta Ombrófila Mista - FOM (Floresta de Araucária) e Florestas Estacionais. Outras classificações reunindo aspectos de vegetação, geomorfológicos e climáticos (AB'SABER, 1969; CPRM, 2006) descreve que parte da Região Sul do Brasil (PR, SC e Norte do RS) está inserida sobre dois domínios morfoclimáticos:

- I) Domínio dos Planaltos Úmidos Subtropicais da Mata de Araucária, um domínio morfoclimático de floresta de coníferas de clima temperado situado no interior dos estados do Paraná e Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul
- II) Domínio de Mares e Morros, situado região leste (litoral brasileiro), onde se encontra a Floresta Atlântica que possui clima diversificado.

O Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense (referido como Escudo Rio Grandense por alguns autores) e a Planície Costeira/RS estão situados na porção Centro-Meridional do Estado do Rio Grande do Sul. A geomorfologia do Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense é caracterizada pela perda de sedimentos, de rochas cristalinas cristalofílicas pré-cambrianas, e a Planície Costeira/RS é caracterizada pelo inverso, ou seja, o processo sedimentar estaria se sobrepondo ao processo erosivo independentemente das cotas altimétricas (AB'SABER, 1969).

Outras classificações desconsideram a existência do Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense, na porção meridional do RS, dividindo a área em quatro padrões morfológicos principais: Planalto Sul-Rio-Grandense; Depressão do rio Ibicuí; Coxilha de Haedo; Planalto de Uruguaiana, além da Planície Litorânea/RS (CRPM, 2008).

A Planície Costeira do Rio Grande do Sul possui uma área de 33.000 km<sup>2</sup> e mais de 100 km de largura, e é a mais ampla planície costeira do país, estendendo-se por cerca de 620 km, desde a cidade de Torres, ao norte, até a desembocadura do Arroio Chuí, ao sul (TOMAZELLI e VILLWOCK, 2000). Esta região compreende uma faixa alongada de extensos campos de dunas, planícies e terraços marinhos e banhados estendendo-se na zona litorânea entre Santa Catarina e o Chuí (CRPM, 2008).

Nestas regiões (Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense e a Planície Costeira/RS), o Bioma dominante é o Pampa. A vegetação é dominada por gramíneas que formam extensos campos delimitados pelas florestas ripárias (PILLAR *et al.* 2009). O relevo desse bioma varia de suave-ondulado no Centro do estado à forte-ondulado na Serra do Sudeste e na divisa com a Argentina e nas regiões litorâneas os campos possuem uma grande extensão plana (PILLAR *et al.* 2009).

Exceto pela Planície Costeira/RS, as demais regiões do Rio Grande do Sul são tradicionalmente denominadas como Campanha Gaúcha, denominadas por alguns autores como Domínio das Coxilhas Úmidas Subtropicais da Campanha Gaúcha, que compreende o Domínio sul do Rio Grande do Sul (AB'SABER, 1969; CPRM, 2006). O clima é subtropical e úmido sendo bastante vulnerável ao avanço das massas polares, em especial no inverno, quando ocorre o vento “minuano” (CPRM, 2006). A formação herbácea da região é similar às pradarias de clima temperado, caracterizada por campos limpos (CPRM, 2006). A Campanha Gaúcha é delimitada, a norte, pela depressão dos rios Jacuí e Ibicuí, onde áreas rebaixadas são formadas por depressões periféricas que

separam o Escudo Sul-Rio-Grandense da Mata Atlântica, a leste é delimitada pela planície litorânea das lagoas dos Patos e Mirim e ao sul o domínio se estende pelo território uruguaio e parte do território argentino (CPRM, 2006).

## 2.10 PROBLEMÁTICAS TAXONÔMICAS

Nos últimos anos, trabalhos envolvendo filogenias de roedores neotropicais têm associado, normalmente, marcadores moleculares (principalmente *cyt b* e/ou IRBP) e aspectos morfológicos (principalmente craniometria). Na Subfamília Sigmodontinae (Cricetidae), as tribos Oryzomyini e Akodontini têm sido mais investigadas, resultando em descrição de novas espécies e propostas para novos gêneros (WEKSLER *et al.*, 1999; HOFFMAN *et al.*, 2002; WEKSLER, 2003; WEKSLER e BONVICINO, 2005; PARDIÑAS *et al.*, 2005; WEKSLER *et al.*, 2006; JAYAT *et al.*, 2008). Os primeiros estudos em filogenia, que propõe elucidar a história evolutiva destas tribos, foram embasados em análises de fósseis por Reig (1984,1987). Propostas moleculares utilizando sequências de mtDNA (SMITH E PATTON, 1999), ou mesmo aliando dados de mtDNA e nucleares (D'ELIA *et al.*, 2007; VENTURA *et al.*, 2013), foram realizadas comparando vários gêneros e espécies destas tribos.

Muitos autores sugerem que esta tribo Akodontini seja monofilética e evolutivamente derivada de um estoque Oryzomino primitivo (GARDNER e PATTON, 1976; BIANCHI *et al.*, 1971; REIG 1977, 1984). Dados de análises cladísticas baseadas em seqüências de DNA nuclear e mitocondrial, em roedores sigmodontinos, corroboram a condição monofilética dos akodontinos (D'ELÍA, 2003). Os dados deste autor refutam, porém, a hipótese de que os akodontinos tenham evoluído a partir de um estoque oryzomino e que posteriormente originou os filotinos, já que os dados cladísticos sugerem que os filotinos e oryzominos sejam distantemente relacionados com os akodontinos.

Taxonomicamente o gênero *Oxymycterus* também apresenta bastante controversias, devido principalmente a dificuldades na detecção de variação morfológica e citogenética, levando alguns autores a considerar algumas das formas nominais como coespecíficas (BURMEISTER, 1854; CABRERA, 1961; HERSHKOVITZ, 1994; MUSSER e CARLETON, 1993; MUSSER e CARLETON, 2005; REIG, 1987; VITTULO, *et al.* 1986). Uma das problemáticas envolvendo o gênero *Oxymycterus* recentemente elucidadas por

Hershkovitz (1998), utilizando medidas morfológicas, foi designação de um novo gênero, *Brucepattersonius*, anteriormente descrito por Thomas (1896) como '*Oxymycterus iherengi*'. O autor ainda designou seis novos táxons: *B. albinasus*, *B. soricinus*, *B. griserufescens*, *B. iheringi*, *B. igniventris* e *Brucepattersonius* sp. Corroborando com os resultados de Hershkovitz (1998), Bonvicino *et al.* (1998) descreve o cariótipo do gênero em  $2n=52$ .

Muitas questões são levantadas sobre a relação entre as espécies deste grupo, tendo como conflito a determinação de limites entre as espécies. No fim do século passado, diversos conflitos na sistemática foram abordados, como por exemplo, Vaz Ferreira (1960) que reconheceu a espécie *O. nasutus* como uma subespécie de *O. rufus* (Argentina), enquanto Ximénez *et al.* (1972), no Uruguai atribuí *O. nasutus* como sendo sinônimo de *O. rutilans* (posteriormente ratificado por Hershkovitz, 1994, por se tratar de uma forma juvenil de *O. rufus*). Outros autores como Langguth (1976) e Langguth e Anderson (1980), ainda em estudos no Uruguai, consideram *O. nasutus* e *O. rufus* como uma espécie única.

Nas propostas mais recentes, dentro do contexto de delimitação de espécies deste grupo, autores como Hershkovitz (1994) divide o gênero geograficamente em dois grupos, o Atlântico e o Andino, que através de medidas, externas e craniométricas, foram classificadas de tamanho pequeno, médio e grande. Este autor ainda ressalta que muitas das espécies descritas para o grupo 'Atlântico' são na verdade formas jovens de *O. rufus*. Dentre o grupo Atlântico de Hershkovitz: *O. dasytrichus*, *O. hispidus*, *O. angularis*, *O. judex*, *O. misionalis* e *O. rostellatus*\*. Este último designado por Musser e Carleton (2005) como sinônimo de *O. dasytrichus*.

Na ultima proposta de sistemática para este gênero, Oliveira (1998), no entanto, rejeita a ideia que tamanho seja um fator importante limitante como marcador taxonômico de identidade. Este autor, utilizando os espécimes tipo do gênero depositado em coleções, revisa uma delimitação independente de tamanho das unidades evolutivas e que revelou vários grupos de espécies relativamente alopátricas. Além disso, o autor observou que a maior parte do grupo Atlântico proposta por Hershkovitz (1994), foram reconhecidos como tendo tamanhos variáveis independente da distribuição geográfica ao leste da América do Sul. Dentro deste contexto, uma espécie pode mostrar uma diferenciação morfológica e genética das suas populações periféricas, devido à

descontinuidade do fluxo gênico relacionada com a distância geográfica (MAYR e ASHLOCK, 1991; WRIGHT, 1943).

Oliveira (1998), com base em análises de medidas morfológicas e utilizando materiais tipos depositados em coleções, propõe a existência de 10 grupos do gênero, com um espectro amostral entre o Brasil, Uruguai, Argentina e região do Andes (Tabela 3). O autor ainda sugere uma suposta relação das amostras simpátricas com membros destes grupos. Portanto, uma avaliação das relações entre amostras simpátricas e estes complexos de espécies poderiam fornecer uma avaliação mais confiável da validade desses grupos como unidades taxonômicas distintas.

**TABELA 3.** Grupos propostos por Oliveira (1998) \*:

ESPÉCIES	GRUPO
<i>O. amazonicus</i>	<b><i>O. amazonicus</i></b>
<i>O. angularis</i>	<b><i>O. angularis</i></b>
<i>O. delator</i>	<b><i>O. delator</i></b>
<i>O. inca</i>	<b><i>O. inca</i></b>
<i>O. nasutus</i>	<b><i>O. nasutus</i></b>
<i>O. rufus</i>	<b><i>O. rufus</i></b>
<i>O. dasytrichus</i> , <i>O. hispidus</i> e <i>O. roberti</i>	<b>“dasytrichus”</b>
<i>O. judex</i> , <i>O. misionalis</i> , e <i>O. quaestor</i>	<b>“judex”</b>
<i>O. juliacae</i> , <i>O. hiska</i> e <i>O. nigrifrons</i>	<b>“juliacae”</b>
<i>O. paramensis</i> e <i>O. hucucha</i>	<b>“paramensis”</b>

\*Devido a época do estudo e/ou ao panorama amostral, não estão listadas todas as espécies do gênero.

Nos últimos anos, estudos integrativos, relacionando dados morfológicos e moleculares, vêm sendo desenvolvidos dentro do gênero *Oxymycterus*, embora de forma muito restrita e a poucas localidades. Recentemente, Gonçalves e Oliveira (2004), investigaram espécimes coletados na região de Viçosa (MG), cujos fenótipos são reconhecidos como "avermelhado" e "escuro", incluindo os grupos *rufus* (encontrado em MG, Argentina e Uruguai), *dasytrichus* (MG) e *judex* (amostrados no estado do Rio de Janeiro). Os autores atribuíram as duas formas simpátricas como espécies distintas, uma

relacionada ao grupo *dasytrichus* e a outra ao grupo *rufus*. O resultado deste trabalho apoia que a espécie *O. rufus* tem um modelo de isolamento fenotípico por distância, e a espécie *O. dasytrichus* possui um padrão gradual de diferenciação fenotípica ao longo de um eixo norte-sul no grupo. Hoffman *et al.* (2002), aliado a dados morfométricos e moleculares, descreve uma nova espécie para o gênero, *Oxymycterus josei*, e que, embora ocorra de forma simpátrica (litoral do Uruguai) e de padrão morfológico externo bem semelhante a espécie *O. nasutus*, medidas craniométricas e sequências de *cyt b* a colocam num clado a parte, e inclusive mais próxima da espécie *O. rufus*.

Um dos últimos trabalhos abordando o gênero, Jayat *et al.* (2008) descreve uma nova espécie, *Oxymycterus wayku*, no extremo sul da região de Yungas na Argentina. Características morfológicas externas permitiram inferir que esta espécie é diferente das de *O. paramensis* e *O. akodontius* (os dois táxons atualmente reconhecidos para o Noroeste da Argentina). A coloração, posição das garras e medidas craniométricas diferem daquelas de ocorrência simpátrica, além disso, a análise filogenética baseada em sequências do citocromo *b* corrobora o carácter distintivo de *Oxymycterus wayku*.

A abordagem das espécies ocorrentes no sul do Brasil (*O. nasutus*, *O. judex*, *O. delator* e *O. quaestor*) de forma secundária nos estudos anteriormente mencionados levou ao reconhecimento de problemas taxonômicos conspícuos, tal como a ausência de monofilia recíproca entre *O. quaestor* e *O. judex*. As distancias genéticas ainda não são conhecidas, e sequer foram exploradas entre essas espécies, de forma que possam ser comparadas, e discutidos os limites entre elas. Também, o conhecimento vago das formas nominais do Sul do Brasil, proposto como parte de um 'grupo' de espécies, ainda não foi explorado e necessita ser elucidado.

### 3 JUSTIFICATIVA

O gênero *Oxymycterus* possui uma problemática eminente quanto sua taxonomia. Para o Sul do Brasil são descritas quatro espécies: *O. nasutus*, *O. judex*, *O. quaestor* e *O. delator*, e embora seja possível a identificação em nível genérico via técnicas citogenéticas e morfológicas, como medidas corporais e craniométricas, não há caracteres morfológicos estáveis que diferenciem as espécies entre si. Devido a sua semelhança cariotípica, tanto no número diploide, quanto de braços dos cromossomos autossômicos ( $2n = 54$  e  $NF_A = 64$ ), inclusive em seus padrões de bandas, verifica-se a necessidade de estabelecer as distâncias genéticas intra e interespecíficas, considerando a identificação morfológica dos táxons ao longo de sua distribuição geográfica.

A utilização de marcadores moleculares, em especial os marcadores mitocondriais, proporcionaria informações sobre a variabilidade genética das espécimens, e poderia evidenciar agrupamentos não perceptíveis pela análise morfológica. A escolha do gene mitocondrial citocromo b (cyt b), como marcador molecular, é devido a sua rápida evolução por acumular substituições de base, inserções e deleções com taxas mais elevadas que genes nucleares, e também, pela inexistência de material genético homólogo, e assim evitando a ambiguidade causada pela recombinação meiótica que ocorre nos genes nucleares, e que poderiam resultar em uma falsa correlação entre os exemplares estudados. Outro aspecto são os escassos dados moleculares sobre este gênero no Sul do Brasil, portanto enriquecer o banco de dados deste gênero, principalmente pelo panorama desta amostragem é de grande importância para inferir as relações filogeográficas e evolutivas deste grupo. Entretanto, pesquisadores que se propõe a trabalhar com este gênero, ainda que coletando espécimes para suas respectivas coleções e posteriores estudos não relacionados diretamente ao gênero, discordam da existência de algumas das espécies descritas para região Sul do Brasil, designando a existência, com base em caracteres morfológicos, em apenas dois morfotipos: “Pequeno Marrom” (*Oxymycterus judex*) e o “Grande Vermelho” (*Oxymycterus nasutus*).



## 4 OBJETIVOS

### 4.1 OBJETIVOS GERAIS

Este estudo consiste em caracterizar padrões de variação genética em espécimes de *Oxymycterus* spp. ocorrentes no Planalto e Planície do Sul do Brasil (PR, SC e RS), com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* e investigar as relações evolutivas entre linhagens associadas.


#### 4.1.1 Objetivos específicos

- Reconstruir as relações filogenéticas de espécies de *Oxymycterus* identificadas no Sul do Brasil;
- Reconhecer através de dados genéticos, pelo menos, duas espécies identificadas para essa região: *O. nasutus* e *O. quaestor*;
- Investigar as relações intraespecíficas de *O. nasutus* e testar a hipótese de estruturação geográfica Planície vs. Planalto Meridional;
- Caracterizar a variação genética da espécie *O. quaestor*;
- Estimar a distância genética intra e interespecífica de exemplares *Oxymycterus*, e contribuir para a elucidação taxonômica deste gênero no Sul do Brasil.

## 5 MATERIAL E MÉTODOS

### 5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS

Foram utilizados 181 espécimes do gênero *Oxymycterus*. Os indivíduos são provenientes de 42 localidades (Figura 9) dos Estados: do Paraná (11 localidades), de Santa Catarina (15 localidades) e do Rio Grande do Sul (16 localidades).



**Figura 9.** Distribuição geográfica do sul do Brasil dos *Oxymycterus* coletados neste estudo. Pontos indicam a localidade de amostragem. Localidades dos pontos de referência estão na Tabela 4.

A descrição da amostragem dos espécimes de *Oxymycterus* analisados, as localidades amostradas, número de registro, local de depósitos, assim como as coordenadas geográficas, estão listadas em uma tabela, ver ANEXO I.

**TABELA 4.** Pontos amostrais dos espécimes de *Oxymycterus* analisados, localidades amostradas, Bioma inserido, coordenadas geográficas (decimais).

Ponto	Bioma	Estado	Localidade	Latitude	Longitude
1	Mata Atlântica	PR	Guaraqueçaba/Índios	-25,306944	-48,3288
2	Mata Atlântica	PR	Guaraqueçaba/Massarapuã	-25,345051	-48,434984
3	Mata Atlântica	PR	Morretes/Marumbi	-25,3469159	-48,76826
4	Mata Atlântica	PR	Jaguariaíva/Faz. Cha. do Sto Antônio	-24,250833	-49,705833
5	Mata Atlântica	PR	Ponta Grossa/Vila Velha	-25,095	-50,161944
6	Mata Atlântica	PR	São Mateus do Sul/Fazenda Durgo	-25,873889	-50,382778
7	Mata Atlântica	PR	Piraquara	-25,429722	-49,271944
8	Mata Atlântica	PR	Curitiba- Mata da Varzea	-25,441944	-49,062778
9	Mata Atlântica	PR	São José dos Pinhais/Guaricana	-25,717171	-49,135068
10	Mata Atlântica	PR	São José dos Pinhais/Barro Preto	-25,5799	-49,175373
11	Mata Atlântica	PR	Candói	-25,570833	-52,052778
12	Mata Atlântica	SC	Itapoá	-26,116944	-48,6158
13	Mata Atlântica	SC	Luiz Alves	-26,720833	-48,932778
14	Mata Atlântica	SC	Gaspar	-26,930833	-48,958889
15	Mata Atlântica	SC	Indaial	-26,897778	-49,231944
16	Mata Atlântica	SC	Blumenau	-26,908889	-49,072222
17	Mata Atlântica	SC	Dr. Pedrinho	-26,713889	-49,482778
18	Mata Atlântica	SC	Ibirama	-27,056944	-49,517778
19	Mata Atlântica	SC	Anitápolis	-27,901944	-49,128889
20	Mata Atlântica	SC	São José do Cerrito	-27,662778	-50,581001
21	Mata Atlântica	SC	Campo Belo do Sul	-27,898889	-50,760833
22	Mata Atlântica	SC	Abdon Batista	-27,610833	-51,022778
23	Mata Atlântica	SC	Água Doce	-26,997778	-51,555833
24	Mata Atlântica	SC	Faxinal dos Guedes	-26,852778	-52,261001
25	Mata Atlântica	SC	São Domingos	-26,557778	-52,531944
26	Mata Atlântica	SC	Itá	-27,290833	-52,322778
27	Mata Atlântica	RS	Erechim	-27,633889	-52,273889
28	Mata Atlântica	RS	Cambará do Sul <sup>1</sup>	-29,191667	-50,0975
29	Mata Atlântica	RS	Cambará do Sul <sup>2</sup>	-29,084606	-50,366
30	Mata Atlântica	RS	Pró-Mata /São Francisco de Paula	-29,550768	-50,276487
31	Pampa	RS	Guaíba	-30,113889	-51,325
32	Pampa	RS	Barra do Ribeiro	-30,290833	-51,300833
33	Pampa	RS	Tapes	-30,72778	-51,395833
34	Pampa	RS	Camaquã	-30,850833	-51,811944
35	Pampa	RS	Cristal	-31,002778	-52,05
36	Pampa	RS	São Lourenço do Sul	-31,365	-51,977778
37	Pampa	RS	HBITL-Pelotas	-31,771944	-52,342778
38	Pampa	RS	Pedro Osório-Ar. Moreira	-31,863889	-52,822778
39	Pampa	RS	Herval	-32,023889	-53,395833
40	Pampa	RS	Mata Estrada Velha-Rio Grande	-32,035	-52,098889

41	Pampa	RS	APA Lagoa Verde- Rio Grande	-32,139934	-52,181064
42	Pampa	RS	ESEC Taim- Rio Grande	-32,7425	-52,574444

Os espécimes coletados no estado do Paraná foram preparados e cariotipados no Laboratório de Citogenética Animal do Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná (UFPR), aqueles coletados em Santa Catarina, pelo Laboratório de Biologia da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), e os do Rio Grande do Sul, pelo Laboratório de Citogenética e Evolução do Departamento de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em alguns exemplares do Rio Grande do Sul e do Paraná não foram feitas análises citogenéticas, constando apenas identificação através de caracteres morfológicos.

## 5.2 MÉTODOS

A metodologia utilizada neste trabalho foi visando à obtenção do sequenciamento parcial do gene mitocondrial citocromo *b*, que consiste em sequências nucleotídicas de uma determinada região do DNA mitocondrial, totalizando 743 pares de base (pb). Para tal, seguiram-se os passos listados abaixo:

### 5.2.1 Extração de DNA

O isolamento do DNA genômico total foi feito no Laboratório de Citogenética de Vertebrados do Departamento de Genética da UFRGS, a partir de tecidos como orelha, fígado, rim e músculos, conservados a -20°C e em etanol 70%, utilizando o kit de extração PureLink® Genomic DNA (Invitrogen, Life Technologies), seguindo instruções do fabricante.

### 5.2.2 Quantificação do DNA

A integridade do DNA extraído foi determinada por eletroforese em gel de agarose 1,0% em TBE 1x (TRIS 0,089 M, ácido bórico 0,089 M e EDTA 0,5 M), por 30 minutos a 100 V, com aplicação de 3 a 4 µl de DNA extraído com 2 µl de azul de bromofenol 3% contendo 1 µL de GelRed® (Biotium). As bandas de alto peso molecular reveladas foram fotografadas sob luz UV para registro e controle dos resultados positivos. Amostras do

DNA extraído foram quantificadas no espectrofotômetro NanoDrop® 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc.), apresentando variação entre 0,8 ng/μl à 4916,2 ng/μl de densidade ótica.

Após a quantificação do material extraído foi realizado alíquotas em água destilada e autoclavada, contendo aproximadamente 20 ng/μl de solução. As amostras com baixa concentração (< 0,8) não foram diluídas e usadas diretamente na reação em cadeia da polimerase. Amostras que apresentaram valores nulos (ou negativos) de quantificação ou não apresentaram bandas de alto peso molecular em gel de agarose, mesmo após novas extrações, foram excluídas da análise.

### 5.2.3 Amplificação do gene mitocondrial citocromo *b*

A fase de amplificação do gene mitocondrial *cyt b* (citocromo *b*) foi realizada no Laboratório de Citogenética de Vertebrados do Departamento de Genética da UFRGS. Os oligonucleotídeos iniciadores (*primers*) utilizados na amplificação foram: MVZ05 (5' CGAAGCTTGATATGAAAAACCATCGTTG 3') *light strand*, MVZ16 (5' AAATAGGAARTATCAYTCTGGTTTRAT 3') *heavy strand* e o MVZ26 (5' AGATCTTTGATTGTGTAGTAGGGGT 3') *heavy strand*, desenvolvidos por Smith e Patton (1993), especificamente para roedores sul-americanos. O iniciador MVZ05 tem a posição de início na base 14115 no mtDNA, sendo lotado no gene anterior ao *cyt-b*, o NADH 6, flanqueados pelos tRNA-Glu e tRNA-Thr (Figura 6). O MVZ16 tem início na base 14940 e o MVZ26 tem início 14800. Estes três iniciadores formaram dois conjuntos utilizados: MVZ05-MVZ16, amplificando 801 pb, e MVZ05-MVZ26 amplificando aproximadamente 700 pb.

As sequências do gene citocromo *b* (*cyt b*) foram amplificadas por reação em cadeia da polimerase (PCR, *polymerase chain reaction*), sendo todos os iniciadores cedidos pelo Laboratório de Citogenética de Vertebrados do Departamento de Genética da UFRGS numa concentração total de 20 μL por amostra, sob as seguintes condições:

- 12,7 μL de água destilada;
- 2 μL de tampão (10x);
- 1,5 μL de MgCl<sub>2</sub> (50 mM);

- 0,2 µL do primer *forward* **MVZ05** (0,4pmol/ µL);
- 0,2 µL do primer *reverse* **MVZ16** ou **MVZ 26** (0,4pmol/ µL);
- 0,2 µL de dNTP (0,4 mM);
- 0,2 µL de Taq DNA polimerase (5 U/µL);
- 3 µL do DNA extraído (em concentração de 20 ng/µL)

No termociclador, as amostras foram submetidas ao seguinte programa: desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 15 segundos, anelamento a 47°C por 30 segundos, extensão a 72°C por 30 segundos, e uma extensão final de 72°C por 7 minutos.

Os produtos de amplificação obtidos foram verificados em gel de agarose 1% com tampão TBE (Tris-borato-EDTA), corado com 2 µL azul de bromofenol 3% contendo 1 µL de GelRed® (Biotium). As bandas de alto peso molecular foram reveladas, e fotografadas sob luz UV para registro dos resultados positivos.

#### 5.2.4 Purificação das amostras de PCR

Para a reação de purificação utilizou-se 6 µL do produto de PCR de cada amostra, juntamente com 1 µL do mix de enzimas contendo:

- 0,10 µL de Exonuclease I (Thermos Scientific);
- 0,25 µL de Alkaline Phosphatase (Thermos Scientific);
- 0,65 µL de água ultrapura.

As amostras foram submetidas a um programa no termociclador de 37°C por 30 minutos e aquecidas a 80°C por 15 minutos, num total de 45 minutos de processo.

#### 5.2.5 Sequenciamento

As reações de PCR purificadas foram enviadas a empresa Macrogen (Coréia do Sul) para sequenciamento com os mesmos iniciadores (MVZ05, MVZ16 e/ou MVZ 26) no sequenciador automático 3730XL DNA Analyzer, da Applied Biosystems®.

### 5.3 ANÁLISES DAS SEQUÊNCIAS

Para a edição e alinhamento das sequências utilizou-se o programa MEGA v6 (TAMURA *et al.*, 2011). Análises de distancia evolutivas foram calculadas utilizando os critérios de Kimura 2-parâmetros (KIMURA, 1980) através do software MEGA v6. Medidas padrão de variabilidade genética, como número de sítio variáveis (S), diversidade haplotípica (Hd) (NEI, 1987) e nucleotídica ( $\pi$ ) (NEI e JIN, 1989) foram feitas através do programa DnaSP v5 (ROZAS *et al.*, 2010).

#### 5.3.1 Análises Filogenéticas

A filogenia foi reconstruída utilizando-se inferência bayesiana através do programa BEAST v2 (BOUCKAERT *et al.*, 2014) utilizando 743 pares de base (pb) de sequencias do gene mitocondrial citocromo b em dois níveis taxonômicos: (i) entre as 12 espécies de *Oxymycterus* (interespecífica) e (ii) entre os espécimes de *Oxymycterus nasutus* (intraespecífica). O modelo de substituição nucleotídica foi estimado utilizando o programa MrModeltest v2.3 (NYLANDER, 2004), seguindo o critério de informação de Akaike. Duas corridas independentes de cadeias de Markov e Montecarlo (MCMC) foram realizadas com 250 e 25 milhões de gerações, para as abordagens inter e intraespecífica, respectivamente, e a amostragem das árvores foi feita a cada 25000 e 2500 gerações, respectivamente. O tamanho efetivo dos parâmetros de amostragem das cadeias de MCMC ( $> 200$  ESS) foi verificado usando o software Tracer v1.5 (<http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/>). Duas corridas independentes foram sumarizadas no software TreeAnnotator v1.6.2 (DRUMMOND e RAMBAUT, 2007), onde as primeiras árvores (~10%) foram descartadas e o restante usado para inferir uma árvore *a posteriori*, visualizada no programa Figtree v1.3.1 ([http://tree.bio.ed.ac.uk / software / figtree /](http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/)).

### 5.3.2 Análises populacionais

Para avaliar as relações evolutivas entre as sequências utilizou-se o programa DnaSP v5 para obtenção dos haplótipos para cada um dos genes. As relações intraespecíficas, i.e., avaliação da estrutura populacional, foram estabelecidas com base em redes de haplótipos construídas no programa Network v4.6 (<http://www.fluxus-engineering.com>) utilizando o critério de Median-Joining (BANDELT *et al.*, 1999). A estimativa de diversidade de haplótipos e nucleotídeos foi feita no software DnaSP v 5. Eventos passados, como expansão ou redução populacional, foram inferidos com base em estimativas dos testes de neutralidade, como D de Tajima (TAJIMA, 1989), Fs de Fu (FU, 1997).

## 6 RESULTADOS

### 6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS

Foram utilizados em análise 743 pb do gene *cyt b*, de 181 espécimes do gênero *Oxymycterus* amostrados ao longo da região Sul do Brasil. Foram incluídas nas análises estatísticas e de filogenias, 49 sequencias obtidas no Genbank (Tabela 6), representando 12 espécies do gênero *Oxymycterus*, além do akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* (Acesso: JQ898084), utilizado como grupo externo, de forma a enraizar a árvore na Inferência Bayesiana. As 230 sequências analisadas (181 espécimes deste estudo + 49 sequências do Genbank), apresentaram 268 sítios variáveis (36%), sendo os índices das frequências nucleotídicas do *cyt b*: T, 28,8%; C, 30,2%; A, 27,8% e G, 13,2%.

A distância genética média entre as espécies de *Oxymycterus* foi de 5,79%. A menor distância observada foi 0,2% (entre *O. misionalis* e *O. judex*) e a maior de 10,79% entre o *O. paramensis* e o clado aff. *quaestor* (Tabela 5). Todas as sequências geradas serão depositadas na base de dado Genbank.



**TABELA 5.** Média de distâncias genéticas observadas (K2P, expressa em %) entre os pares de haplótipos de *cyt b* de diferentes espécies de *Oxymycterus*.

Taxa	<i>J. huanchacae</i>	<i>quaestor</i>	<i>aff. "quaestor"</i>	<i>misionalis</i>	<i>judex</i>	<i>nasutus</i>	<i>dasytrichus</i>	<i>josei</i>	<i>rufus</i>	<i>hiska</i>	<i>paramensis</i>	<i>wayku</i>	<i>amazonicus</i>	<i>delator</i>
<i>J. huanchacae</i>														
<i>quaestor</i>	13,37													
<i>aff. "quaestor"</i>	13,65	4,16												
<i>misionalis</i>	11,76	1,69	4,15											
<i>judex</i>	11,51	1,48	3,95	0,20										
<i>nasutus</i>	11,37	6,75	8,16	4,91	5,12									
<i>dasytrichus</i>	12,99	7,76	9,08	5,87	6,10	4,94								
<i>josei</i>	10,48	5,71	7,33	4,33	4,11	5,70	5,79							
<i>rufus</i>	11,19	5,89	7,46	5,31	5,09	6,33	6,40	1,88						
<i>hiska</i>	11,11	8,46	9,73	6,54	6,77	5,80	6,22	8,11	8,74					
<i>paramensis</i>	10,12	9,88	10,79	7,91	8,14	8,32	8,72	8,11	9,39	6,82				
<i>wayku</i>	11,11	7,53	8,83	5,65	5,87	4,44	4,30	5,41	6,25	5,91	5,91			
<i>amazonicus</i>	9,64	7,99	9,14	6,54	6,32	4,86	4,07	5,85	6,44	7,28	7,28	5,47		
<i>delator</i>	11,46	8,99	9,69	7,06	7,29	4,91	4,24	6,81	7,36	7,34	8,27	5,53	2,52	
<i>Oxymycterus</i> sp. (P495)	10,61	8,93	9,71	6,99	7,22	3,97	3,82	5,85	6,44	6,36	6,36	4,59	2,45	3,37

\*Espécies ocorrentes no Sul do Brasil em azul: *O. nasutus*, *aff. "quaestor"*, *O. dasytrichus* e *Oxymycterus* sp. (P495) amostrados neste estudo, juntamente com as sequências obtidas do Genbank e/ou agrupadas com cada grupo taxonômico.

**TABELA 6.** Sequências parciais (743 pares de base) do gene mitocondrial citocromo b utilizadas na análise filogenética e comparações de distância genética no gênero *Oxymycterus*, obtidas a partir da base de dados de acesso público Genbank. Para todas as sequências são fornecidos o número de acesso e a correspondente referência.

#	Táxon	Número de acesso (Genbank)	Referência
1	<i>O. hiska</i>	U03542	Smith e Patton (1993)
2	<i>O. nasutus</i>	DQ518258	Jayat <i>et al.</i> (2008)
3	<i>O. nasutus</i>	EF661854	Montes <i>et al.</i> (2008)
4	<i>O. nasutus</i>	AF175286	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
5	<i>O. nasutus</i>	AF175287	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
6	<i>O. josei</i>	AF175288	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
7	<i>O. josei</i>	AF175289	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
8	<i>O. misionalis</i>	DQ518257	Jayat <i>et al.</i> (2008)
9	<i>O. misionalis</i>	EU449517	D'Elia <i>et al.</i> (2008)
10	<i>O. amazonicus</i>	AF454765	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
11	<i>O. delator</i>	AF454766	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
12	<i>O. delator</i>	AF454767	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
13	<i>O. delator</i>	U03525	Smith e Patton (1993)
14	<i>O. delator</i>	DQ518256	Jayat <i>et al.</i> (2008)
15	<i>O. delator</i>	AY275125	D'Elia (2003)
16	<i>O. dasytrichus</i>	AF454768	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
17	<i>O. dasytrichus</i>	AF454769	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
18	<i>O. dasytrichus</i>	AF454770	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
19	<i>O. dasytrichus</i>	AF454771	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
20	<i>O. dasytrichus</i>	AF516662	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
21	<i>O. dasytrichus</i>	AF516659	Hoffman <i>et al.</i> (2002)

22	<i>O. dasytrichus</i>	AF516658	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
23	<i>O. dasytrichus</i>	AF516657	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
24	<i>O. dasytrichus</i>	AF516663	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
25	<i>O. dasytrichus</i>	AF516664	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
26	<i>O. dasytrichus</i>	AF516665	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
27	<i>O. quaestor</i>	AF454772	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
28	<i>O. quaestor</i>	AF516660	Gonçalves e Oliveira (2004)
29	<i>O. quaestor</i>	AF516661	Gonçalves e Oliveira (2004)
30	<i>O. judex</i>	AF454773	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
31	<i>O. judex</i>	AF454774	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
32	<i>O. rufus</i>	AF454775	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
33	<i>O. rufus</i>	AF454776	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
34	<i>O. rufus</i>	AF454777	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
35	<i>O. rufus</i>	AF516652	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
36	<i>O. rufus</i>	AF516651	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
37	<i>O. rufus</i>	AF516653	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
38	<i>O. rufus</i>	AF516654	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
39	<i>O. rufus</i>	AF516655	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
40	<i>O. rufus</i>	AF516666	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
41	<i>O. rufus</i>	AF516667	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
42	<i>O. rufus</i>	AF516668	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
43	<i>O. rufus</i>	AF516669	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
44	<i>O. rufus</i>	AY275126	D'Elia (2003)
45	<i>O. rufus</i>	AY275127	D'Elia (2003)
46	<i>O. paramensis</i>	DQ518259	Jayat <i>et al.</i> (2008)
47	<i>O. paramensis</i>	DQ518260	Jayat <i>et al.</i> (2008)
48	<i>O. paramensis</i>	DQ518261	Jayat <i>et al.</i> (2008)
49	<i>O. wayku</i>	DQ518262	Jayat <i>et al.</i> (2008)

---

## 6.2 ANÁLISE FILOGENÉTICA


A partir de sequências parciais do gene citocromo b foi obtida uma árvore filogenética consenso para 12 espécies do gênero *Oxymycterus* (Figura 10). O status de monofilia do gênero é recuperado com alto suporte estatístico de probabilidade posterior bayesiana (PPB) igual a 1. O clado mais basal é formado por duas espécies, *O. hiska* e *O. paramensis*, entretanto, com baixo suporte da Probabilidade Posterior Bayesiana (PPB = 0,63). Excluindo o clado mais basal, *O. wayku* é evidenciada como a espécie mais externa também com baixo suporte de ramo (PPB = 0,82). A árvore recuperada apresenta uma relação pouco resolvida entre as espécies *O. judex* e *O. misionalis* (que apareceram

como polifiléticas). A amostra *Oxymycterus* sp (P495) apresenta uma relação imprecisa, proximamente relacionada às espécies *O. delator* e *O. amazonicus*, indicada como uma potencial espécie nova. As sequências obtidas do Genbank correspondente as espécies *O. rufus* e *O. josei* formaram clados irmãos (PPB = 1), assim como o grupo *O. dasythricus* foi estreitamente relacionado com as espécies *O. delator* e *O. amazonicus* (PPB = 0,94). Os espécimes amostrados relacionados à linhagem de *O. nasutus* (mais abundantes deste estudo), agrupados com as sequências do Genbank, formam o maior grupo da árvore proposta, com diversas estruturas internas, embora algumas pouco suportadas (PPB < 0.8). Dois grupos foram verificados, um contendo espécimes predominantemente do Planalto Meridional, e outro espécimes da Planície Costeira.

*Oxymycterus quaestor* também apresenta padrão de estrutura interna, sendo as espécies referencias utilizadas na árvore (obtidas do Genbank) posicionadas externas as demais sequenciadas neste estudo, e em particular dois grupos foram evidentes, intitulados Clado 1 e Clado 2.

Considerando apenas a amostragem deste estudo, os espécimes foram relacionados (agrupados) a cinco espécies formalmente descritas: *O. quaestor*, *O. nasutus*, *O. dasythricus*, *O. delator* e *O. amazonicus*, sendo as quatro primeiras espécies de reconhecida ocorrência no Sul e/ou Sudeste do Brasil.

Todas as espécies e/ou grupos discutidos neste trabalho foram baseados nos agrupamentos gerados pela árvore consenso Bayesiana.




**Figura 10.** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80.

### 6.3 DIVERSIDADE GENÉTICA E PARÂMETROS DE VARIABILIDADE INTRAESPECÍFICA

A partir dos resultados da inferência filogenética foram direcionadas abordagens intraespecíficas para estudos de índices de diversidade genética, análises de parâmetros demográficos populacionais (utilizando testes de neutralidade) e medidas de distância genética em dois grupos específicos analisados: *Oxymycterus* aff. *quaestor*, e na espécie *O. nasutus*. Também foram reconstruídas redes de haplótipos de forma a inferir relações genealógicas dentro de cada uma dessas linhagens, sob um contexto geográfico.

#### 6.3.1 Parâmetros *Oxymycterus* aff. *quaestor*

A filogenia reconstruída utilizando os 59 espécimes morfologicamente denominados como *O. quaestor*, indicou estruturação em grupos conspícuos, proximamente relacionado àquela linhagem (Figura 11 a2). Especificamente estes espécimes formaram dois clados (Clado 1 e Clado 2), cuja distância genética entre si foi de 9,06% (Tabela 7). A divergência entre o Clado 2 e a linhagem *O. quaestor* foi de 2,58% (enquanto Clado 1 vs *O. quaestor* foi de 10,33%) (Tabela 7). Devido ao baixo suporte nodal, apresentado pela PPB, nos referenciamos os clados 1 e 2 da Figura 11 a3 como *Oxymycterus* aff. *quaestor*.



**Figura 11. (A)** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80. **(A1)** Em azul claro (negrito e itálico) as 59 amostras inferidas como relacionadas à linhagem *O. quaestor*, identificadas como clado 1 e clado 2 (*Oxymycterus* aff. *quaestor*).

**TABELA 7.** Média de distâncias genéticas observadas ( $p$  expressa em %) entre os pares de haplótipos de *cyt b* de diferentes clados de *Oxymycterus* aff. *quaestor*, definidos através da inferência Bayesiana, sendo de distribuição exclusiva ao longo do Planalto Meridional, além de três sequências de *Oxymycterus quaestor* disponíveis Genbank.

Grupo	Clado 1	Clado 2
Clado 1	-	-
Clado 2	9,06	-
<i>Oxymycterus quaestor</i> *	10,33	2,58


Dos 59 haplótipos identificados, observa-se uma diversidade nucleotídica total ( $\pi$ ) de 0,03853 e uma diversidade haplotípica total ( $H_d$ ) de 0,89363 (Tabela 8). Os altos valores de  $H_d$  e baixos valores de  $\pi$  encontrados para todos os clados indicam que ocorreu expansão demográfica após um período de baixo tamanho efetivo populacional. Testes de neutralidade  $D$  de Tajima e  $F_s$  de Fu não foram significativos ( $p > 0,01$ ). O índice de fixação gerado foi  $G_{ST}$  de 0,04.

**TABELA 8.** Diversidade genética e resultados dos testes de neutralidade encontrados nos clados identificados e no grupo aff. *quaestor* como um todo.

Grupo	Ind	H	$H_d$	$\pi$	D	$F_s$
Clado 2	45	13	0,81717	0,00619	-2,00137	-8,758
Clado 1	14	13	0,98901	0,06797	1,64044	-1,826
Total	59	26	0,89363	0,03853	-0,35590	-2,983

\*Ind.: número de indivíduos; H: número de haplótipos;  $H_d$ : diversidade haplotípica;  $\pi$ : diversidade nucleotídica; D: teste de Tajima;  $F_s$ : teste de Fu;  $p > 0,01$ .

A Figura 12 e a Tabela 9 mostram os pontos amostrais ao longo da região sul do Brasil, assim como as localidades amostradas, as coordenadas geográficas e os haplótipos de cada ponto referente a rede haplotípica apresentado da Figura 13.



**Figura 12.** Distribuição do *Oxymycterus* aff. *quaestor* determinado pela inferência bayesiana ao longo do Planalto Meridional (inseridos na Mata Atlântica) no sul do Brasil. As referências de amostragem dos pontos (“a” – “q”) estão na Tabela 9.

**TABELA 9.** Lista de haplótipos utilizados para construção da rede haplotípica do *Oxymycterus* aff. *quaestor*, assim como localidades (mostrados na Figura 12), e grupo no qual está inserido.

Ponto	n***	Estado	Localidade	Latitude (S)	Longitude (O)	Haplótipos
a	1	PR	Piraquara	25,441944	49,062778	H23
b	9	PR	São José dos Pinhais <sup>1</sup>	25,717171	49,135068	H2 e H22
c	1	SC	Luiz Alves	26,720833	48,932778	H02
d	2	SC	Gaspar	26,930833	48,958889	H02 e H05
e	2	SC	Blumenau	26,908889	49,072222	H16
f*	12	SC	Indaial	26,897778	49,231944	H01, H02, H05, H16, H18 e H2'
g	4	SC	Dr. Pedrinho	26,713889	49,482778	H02, H06, H08 e H09
h*	2	SC	Ibirama	27,056944	49,517778	H02 e H04
i*	3	SC	Anitápolis	27,901944	49,128889	H02, H13 e H14
j	1	SC	São José do Cerrito	27,662778	50,581001	H10
k*	4	SC	Campo Belo do Sul	27,898889	50,760833	H02, H05 e H07
l	1	SC	Abdon Batista	27,610833	51,022778	H06
m*	4	SC	São Domingos	26,557778	52,531944	H11, H16, H19 e H20

Continua..



<b>n**</b>	1	SC	Faxinal dos Guedes	26,852778	52,261001	H03
<b>o*</b>	7	SC	Itá	27,290833	52,322778	H11, H12, H17, H16 e H17
<b>p</b>	1	RS	Erechim	27,633889	52,273889	H06
<b>q**</b>	4	RS	Cambará do Sul <sup>2</sup>	29,084606	50,366000	H24, H25 e H26


<sup>1</sup> Lodade de Guaricana, <sup>2</sup>Parque Estadual de Tainhas.

\*Localidades com a presença de haplótipos dos dois grupos.

\*\* Pontos amostrais exclusivos do clado 1.

\*\*\* n por localidade.

Além de tais parâmetros, de forma a investigar a relação dos haplótipos para este grupo *Oxymycterus* aff. *quaestor*, realizou-se a construção de uma rede de haplótipos entre os espécimes deste grupo. Os 59 espécimes, com padrão de distribuição limitado a região do Planalto Meridional, geraram uma rede com 26 haplótipos (Figura 13). Para os dois Clados analisados (1 e 2) não foi encontrada estruturação geográfica (Figura 12 e Tabela 9), corroborando com as análises filogenéticas, onde o suporte nodal de cada clado foi baixo (BPP <0,95). A rede neste ponto apresenta uma série de haplótipos extintos ou não amostrados e (i.e. presença de vetores intermediários), e considerando o Clado 2, com poucos passos mutacionais entre si.




**Figura 13.** Rede de haplótipos construída utilizando o método *median-joining*, com base em sequências do *cyt b*, para os 59 indivíduos do grupo aff. *quaestor*. Cada círculo compreende um haplótipo e o seu tamanho é proporcional à frequência. Cada traço nas linhas que conectam os haplótipos representa um passo mutacional. As cores dos haplótipos correspondem a identificação dos haplótipos que foram inferidas utilizando a inferência Bayesiana. Em laranja o Clado 1; e Verde o Clado 2.



### 6.3.2 Parâmetros *Oxymycterus nasutus*

Neste estudo 115 sequências de *cyt b* dos espécimes amostrados se agruparam em um único clado, e de acordo com Inferência Bayesiana, que utilizou quatro sequências como referência desta espécie (Tabela 6), pertence à espécie *O. nasutus* (Figura 15 A2). Além da Inferência Bayesiana, redes haplotípicas foram realizadas para investigar a relação entre estes haplótipos em um contexto geográfico, evidenciando diferenças entre espécimes da Planície Costeira/RS e de Planalto Meridional (Figura 17).

A distância genética entre espécimes de *O. nasutus* amostrados no Planalto e Planície foi de 1,34%. A Figura 14 destaca a distribuição geográfica do *O. nasutus* ao longo do Brasil, em especial, a região Sul do Brasil.



**Figura 14.** Mapa de distribuição geográfica do *Oxymycterus nasutus* ao longo do relevo Brasileiro (BONVICINO, 2008).



**Figura 15. (A)** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80. **(A2)** Em vermelho (negrito e itálico) as 115 amostras inferidas como *Oxymycterus nasutus*.

Este clado apresentou a diversidade nucleotídica total ( $\pi$ ) de 0,01030 e uma diversidade haplotípica total (Hd) de 0,90831 dos 115 *O. nasutus* amostrados (Tabela 10). Os altos valores de diversidade haplotípica e baixos valores de diversidade nucleotídica encontrados indicam que ocorreu expansão demográfica após um período de tamanho populacional ( $N_e$ ) estável. Os testes de neutralidade *D* de Tajima e *F<sub>s</sub>* de Fu não foram significativos ( $p > 0,01$ ). O índice de fixação gerado foi  $G_{ST}$  de 0,09.

**TABELA 10.** Diversidade genética e resultados dos testes de neutralidade encontrados nas linhagens identificadas como *O. nasutus* amostrados, de acordo com a distribuição geográfica.

Linhagem	Ind	H	Hd	$\pi$	D	F <sub>s</sub>
Planalto Meridional	61	15	0,79344	0,00680	-1,50746	-3,540
Planície Costeira	54	16	0,85535	0,00814	-1,32183	-5,740
Total	115	31	0,90831	0,01030	-1,55206	-11,746

\*Ind.: número de indivíduos; H: número de haplótipos; Hd: diversidade haplotípica;  $\pi$ : diversidade nucleotídica; D: teste de Tajima; F<sub>s</sub>: teste de Fu;  $p > 0,01$ .

A Figura 16 e a Tabela 11 mostram os pontos amostrais ao longo da região sul do Brasil, assim como as localidades amostradas, as coordenadas geográficas e os haplótipos de cada ponto referente à rede haplotípica da Figura 17.

**TABELA 11.** Lista de haplótipos utilizados para construção da rede haplotípica do *O. nasutus*, assim como localidades (mostrados na Figura 16), e grupo no qual está inserido.


Ponto	n**	Estado	Localidade	Latitude	Longitude	Haplótipos
a	2	PR	Piraquara	-25,4297	-49,2719	H18
b	15	PR	São José dos Pinhais/Barro Preto	-25,5799	-49,1754	H18
c	9	PR	Mata da Várzea- Curitiba	-25,4419	-49,0628	H18, H20, H21 e H22
d	1	PR	Ponta Grossa/Vila Velha	-25,095	-50,1619	H23
e	1	PR	São Mateus do Sul/Fazenda Durgo	-25,8739	-50,3828	H19
f	1	PR	Candói	-25,5708	-52,0528	H3
g	2	SC	São Domingos	-26,5578	-52,5319	H2
h	2	SC	Água Doce	-26,9978	-51,5558	H5 e H6
i	1	SC	Abdon Batista	-27,6108	-51,0228	H1
j	3	SC	Campo Belo do Sul	-27,8989	-50,7608	H1
k	1	SC	Indaial	-26,8978	-49,2319	H2
l	4	RS	Erechim	-27,6339	-52,2739	H1
m	2	RS	Cambará do Sul <sup>1</sup>	-29,1917	-50,0975	H8
n	17	RS	Pró-Mata /São Francisco de Paula	-29,5508	-50,2765	H8, H26, H27 e H28

o	13	RS	Guaíba	-30,1139	-51,325	H12 e H13
p	7	RS	Barra do Ribeiro	-30,2908	-51,3008	H4, H12 e H31
q	12	RS	Camaquã	-30,8508	-51,8119	H4, H9, H10, H11 e H14
r	1	RS	Tapes	-30,7278	-51,3958	H24
s	2	RS	Cristal	-31,0028	-52,05	H4, H15
t*	5	RS	São Lourenço do Sul	-31,365	-51,9778	H8, H24
u	5	RS	HBITL-Pelotas	-31,7719	-52,3428	H24 e H25
v	4	RS	Pedro Osório-Ar. Moreira	-31,8639	-52,8228	H29 e H30
w	1	RS	Herval	-32,0239	-53,3958	H16
x	2	RS	Mata Estrada Velha-Rio Grande	-32,035	-52,0989	H17
y	1	RS	APA Lagoa Verde- Rio Grande	-32,1399	-52,1811	H7
z	1	RS	ESEC Taim- Rio Grande	-32,7425	-52,5744	H7

<sup>1</sup>Parque Nacional dos Aparados da Serra.


\*Localidade com haplótipo compartilhado entre as linhagens (H08).

\*\* n por localidade.



**Figura 16.** Distribuição do *Oxymycterus nasutus* determinado pela inferência bayesiana ao longo do Planalto Meridional (inseridos na Mata Atlântica) e na Planície Costeira (no Pampa) no sul do Brasil. Os pontos em amarelo: as localidades com a presença de haplótipos da linhagem de Planalto, em azul: haplótipos da linha de Planície.

Para explorar a variabilidade genética dentro da espécie *O. nasutus* associada a aspectos geográficos e da fisionomia geológica da região Meridional, em especial a estruturação Planície vs. Planalto, o que não ficou completamente resolvido na filogenia reconstruída (encontrou-se estrutura de mais de dois grupos), construiu-se uma rede de haplótipos através do método de *median-joining* com as 115 amostras distribuídas ao longo do sul do Brasil, que gerou 31 haplótipos (Figura 17). Destaca-se o padrão de distribuição haplotípica separando o Planalto Meridional e a Planície Costeira (Figura 16), sendo inclusive esta a única espécie, de acordo com a amostragem deste trabalho, com distribuição em região da Planície Costeira. Apesar de observada a estruturação entre as duas grandes formações fisionômicas (referidos também como linhagens), verifica-se o compartilhamento do haplótipo H8 por espécimes das duas supostas linhagens.




**Figura 17.** Rede de haplótipos construída utilizando o método *median-joining*, com base em sequências do *cyt b*, para os 115 indivíduos de *Oxymycterus nasutus*. Cada círculo compreende um haplótipo e o seu tamanho é proporcional à frequência. Cada traço nas linhas que conectam os haplótipos representa um passo mutacional. As cores correspondem a identificação dos haplótipos que foram inferidas utilizando a análise Bayesiana. Em amarelo os espécimes do Planalto Meridional, e em azul os espécimes de Planície Costeira.


### 6.3.3 Parâmetros *Oxymycterus dasytrichus*

Apesar da literatura não relatar a ocorrência desta espécie na região sul do Brasil, a filogenia baseada na Inferência Bayesiana deste trabalho agrupa seis sequências da amostragem como pertencentes à espécie *O. dasytrichus* (Figura 19 A3), com forte suporte dos ramos (PPB = 1). Esta espécie possui uma distribuição ao longo de praticamente todo o Bioma da Mata Atlântica (Figura 18; Oliveira 1998), no qual se incluiria o litoral do estado do Paraná e Santa Catarina, embora até então não tenha sido relatado na literatura. As seis sequências obtidas, oriundas das localidades de Marumbi/Bacia do Rio do Nunes (1), Guaraqueçaba/Índios (3), Guaraqueçaba/Massarapuã (1), no Paraná, e Itapoá (1) em Santa Catarina (Figura 20), não se distinguem em termos haplotípicos das sequências disponíveis no GenBank para *O. dasytrichus* (Figura 19).

Além disso, a distância genética intraespecífica observada, entre as sequências do Genbank e as seis sequências amostradas é <1% de divergência (0,96%).




**Figura 18.** Distribuição do *Oxymycterus dasytrichus* ao longo do território Brasileiro de acordo com Oliveira (1998).



**Figura 19. (A)** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycteris*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80. **(A3)** Em verde destacado em negrito e itálico as 6 amostras inferidas como *Oxymycteris dasythricus*.






**Figura 20.** Mapa de distribuição de *Oxymycterus dasytrichus* no sul do Brasil, de acordo com a Inferência Bayesiana. As localidades numeradas: 1- Guaraqueçaba/Índios (PR), 2- Guaraqueçaba/Massarapuã (PR), 3- Morretes/Marumbi e 4 – Itapoá (SC).

#### 6.3.4 Parâmetros *Oxymycterus* sp.

A figura 19 A3 também mostra que o clado do *O. dasytrichus* é irmão do clado formado por *O. delator* e *O. amazonicus*, com moderado suporte (PPB = 0,94). Entretanto, a amostra P495, da localidade de Jaguariaíva/Fazenda Chapada do Santo Antônio (Figura 21), apresenta relação imprecisa com as sequências de *O. delator* e *O. amazonicus* disponíveis no banco de dados. A Tabela 5 ilustra também as distâncias genéticas entre a amostra *Oxymycterus* sp. (P495) e *O. delator* e *O. amazonicus*, além das demais espécies. Ressalta-se ainda que a amostra P495, foi a única coletada no Bioma do Cerrado presente no estado do Paraná.



**Figura 21.** Ponto amostral do *Oxymycterus* sp. (P495), única amostra coletada no Bioma do Cerrado (em laranja) presente neste estudo. Localidade de Jaguariaíva/Fazenda Chapada do Santo Antônio, no estado do Paraná.

## 7. DISCUSSÃO

A árvore gerada neste trabalho (Figura 10) recuperou agrupamentos já observados em trabalhos anteriores com o gênero (SMITH e PATTON, 1993; HOFFMAN *et al.*; 2002; JAYAT *et al.*, 2008), conforme sequências depositadas no Genbank. Entretanto, dados inéditos utilizando a mais ampla distribuição no Sul do Brasil revelaram posições taxonômicas e potenciais táxons crípticos inesperados. Nas últimas revisões da literatura, a região Sul do Brasil (RS, SC e PR) apresentaria quatro espécies: *Oxymycterus delator*, *O. quaestor*, *O. judex* e *O. nasutus* (OLIVEIRA, 1998; BONCIVINO, 2008). No entanto, verificou-se a ocorrência predominante de duas dessas espécies (*O. nasutus* e *Oxymycterus* aff. *quaestor*), e a presença de um táxon cuja área de ocorrência não abrangia o Sul do Brasil, *O. dasytrichus*, bem como a existência potencial de pelo menos duas espécies novas: *Oxymycterus* aff. *quaestor* (Clado 1) e *Oxymycterus* sp. Ainda, *Oxymycterus nasutus* apresenta estruturação filogeográfica, onde espécimes da Planície Costeira e Planalto Meridional evidenciaram haplótipos quase restritos às regiões de origem.

A distância genética interespecífica média observada no gênero *Oxymycterus* foi de aproximadamente 6%, valor similar ao encontrado em mamíferos de forma geral (BRADLEY e BAKER, 2001).

### 7.1 *Oxymycterus quaestor* x *Oxymycterus* aff. *quaestor*

A espécie *Oxymycterus quaestor* (Thomas, 1903), de acordo com a literatura, possui uma incoerência sobre a sua distribuição. Segundo Wilson e Reeder, (2005) este taxon possui uma distribuição do Nordeste da Argentina (região de Misiones) ao Sudeste do Brasil (norte do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro), incluindo também o extremo Leste do Paraguai, com localidade tipo na região de Roça Nova (Serra Geral) no Estado do Paraná. Entretanto, outros autores registram esta espécie apenas para a localidade-tipo, Roça Nova, na Serra Geral, Estado do Paraná (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006). Além disso, vários autores colocam em debate a existência sólida desta espécie, e atribuem uma condição sinônima com duas outras espécies, *Oxymycterus judex* e *O. misionalis*.

Oliveira (1998), por exemplo, através de análises morfométricas, de algumas espécies “tipo” depositas em coleções, determina que as espécies *Oxymycterus quaestor*, *O. judex* e *O. misionalis* formam um grupo denominado pelo autor como grupo “*judex*”, pela similaridade entre os parâmetros de suas respectivas medidas. Hoffmann *et al.* (2002) corroboram com Oliveira, suportado com dados morfológicos e moleculares, que existe uma proximidade entre as três espécies supracitadas. Este autor em estudos moleculares utilizando *cyt b* encontra uma distância genética entre *O. judex* e *O. quaestor* de 2,8% e assim formam um clado com divergência inferior ao nível de divergência intraespecífica observado em outras espécies, como por exemplo *O. paramensis*, cujos dados de Jayat *et al.* (2008) apontam uma divergência intraespecífica de 4,4 à 6,4% (dependendo da linhagem), sendo sugerido por estes autores o status de espécie plena até que um novo argumento seja apresentado. Jayat *et al.* (2008) assim como Oliveira (1998), propõe que estas três espécies perfazem um único grupo, e também utilizando o mesmo marcador mitocondrial, encontrou uma distância de 2,88% entre *O. quaestor* e *O. judex* / *O. misionalis*. Além disso, o autor ainda evidencia uma menor distância intraespecífica entre *O. judex* e *O. misionalis* (0,5%).

Vale ressaltar que a literatura relata que as espécies *O. judex* e *O. misionalis*, compartilham distribuição geográfica simpátrica ao *O. quaestor*, sendo o *Oxymycterus judex* (Thomas, 1909), com distribuição pelo litoral e serras, do norte do Rio Grande do Sul a São Paulo, ao oeste ao longo do Rio Paraná, no estado do Paraná, até a divisa com o estado de São Paulo, e uma população isolada na Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, sendo a localidade tipo em Joinville, Santa Catarina (BONVICINO, 2008). E o *Oxymycterus misionalis* (Sanborn, 1931) com distribuição na região de Misiones (localidade tipo), Argentina, incluindo a região do afluente do Rio Paraná (OLIVEIRA E BONVICINO, 2008).

Dentro da filogenia proposta neste trabalho, 59 espécimes do total amostral alinharam-se em único clado, e de acordo com a inferência Bayesiana, como um grupo relacionado a *Oxymycterus quaestor* (Figura 11 A1). Formando dois cladogramas, Clado 1 e Clado 2, o grupo denominado como *Oxymycterus* aff. *quaestor*, apresenta suas respectivas distâncias genéticas intraespecíficas mostrados na tabela 7 e entre as demais espécies discutidas na tabela 5. Apesar do alto suporte estatístico de monofilia do grupo *Oxymycterus* aff. *quaestor* (PPB = 1), verifica-se uma expressiva distância genética

intraespecífica neste grupo, com 9,06% de divergência. Estes mesmos clados quando comparados com sequências de *Oxymycterus quaestor* (disponíveis no banco de dados) apresentam diferentes valores de distância, sendo 10,33% de divergência entre o Clado 1 e o *O. quaestor*, e uma distância de 2,58% entre o Clado 2 e o *O. quaestor* (Tabela 7).

Contudo, apesar do *O. quaestor* ser evidenciado na inferência bayesiana como uma forma mais basal em relação ao grupo aff. *quaestor*, o baixo suporte nodal (PPB = 0,42) não descarta a hipótese que estes espécimes façam parte da mesma entidade biológica, já que outros autores como Hoffmann et al. (2002) e Jayat et al. (2008), utilizando o mesmo marcador, observaram distâncias genéticas interespecíficas superiores, de 2,8% entre *O. judex* e *O. quaestor*, e de 2,88% entre *O. quaestor* e *O. judex* / *O. misionalis*, respectivamente. Se compararmos o Clado 2 com o *O. quaestor*, a distância genética intraespecífica é 2,58%, abaixo de distâncias interespecíficas das espécies relacionadas supracitadas. Porém, a divergência de 9,06% intraespecífica do grupo aff. *quaestor*, e de 10,33% entre Clado 1 e as sequências de *O. quaestor* do Genbank atribui o status deste clado como espécies crípticas dentro deste grupo. Essa questão em particular requer análises mais refinadas, tanto com outros marcadores (e.g nucleares), como a investigação mais aprofundada de caracteres morfológicos de forma a se tomar decisões relacionadas à validação da potencial espécie.

A Figura 13 ilustra a relação entre os haplótipos para este grupo (aff. *quaestor*), com a finalidade de exemplificar a relação entre os haplótipos. A rede haplotípica gerada para este grupo conta com 26 haplótipos, com sua distribuição limitada à região do planalto Meridional (Figura 12). As análises filogenéticas e a rede de haplótipos mostraram a separação de aff. *quaestor* em dois clados. Apresentando uma série de ramos longos com muitos passos mutacionais, a rede de haplótipos construída através de *median-joining* (Figura 13) permite visualizar espacialmente de uma forma mais eficiente as relações entre cada um dos haplótipos do grupo aff. *quaestor*, encontrados na Inferência Bayesiana. A rede concorda, de certa forma, com a análise filogenética da Inferência Bayesiana, indicando a presença de dois clados. Entretanto, vale ressaltar a baixa estruturação da Probabilidade Posterior Bayesiana.

A rede haplotípica *median-joining*, construída utilizando sequências do gene *cyt b*, mostrou 26 haplótipos distintos, e uma baixa estruturação geográfica (Figura 12 e Tabela 9), apesar de altos níveis de diversidade (Hd 0.89363, Tabela 8). A rede apresenta uma

alta proporção de haplótipos derivados especialmente considerando o clado denominado 2, o que é também compatível com a expansão populacional e contato secundário. Nos dois Clados (1 e 2) os haplótipos analisados parecem não apresentar estruturação geográfica (Figura 13), corroborando com as análises filogenéticas, onde o suporte nodal de cada clado foi baixo (PPB <0,95). A rede neste ponto apresenta uma série de haplótipos extintos ou não amostrados e, considerando o Clado 1, com muitos passos mutacionais entre si.

As amostras das localidades de Itá, São Domingos, Campo, Belo do Sul, Anitápolis, Indaial e Ibirama apresentam haplótipos dos dois Clados em discussão (1 e 2), e estão ilustrados na Figura 13 e Tabela 9 a disposição onde os mesmos se encontram. Apenas duas localidades desta amostragem (Faxinal dos Guedes e de Cambará do Sul [Parque Estadual de Tainhas]), apresentaram haplótipos exclusivos do Clado 1. As demais localidades do grupo *aff. quaestor*, em sua maioria, apresentaram apenas haplótipos do Clado 2. A Tabela 8 resume as localidades e os haplótipos da Figura 12. Entretanto os haplótipos H01, H03, H04, H13 e H21, pertencentes ao Clado 1, estão de certa forma mais relacionados com os haplótipos do Clado 2, do que os haplótipos mais distantes do seu Clado (H24, H25 e H26). Considerando a proposta de Avise *et al.* (1987), que haplótipos mais frequentes são provavelmente os alelos mais antigos e, haplótipos com múltiplas conexões são mais antigos e apresentam uma distribuição geográfica mais ampla, o haplótipo H02 se enquadra nestas características, contemplando 5 localidades ao longo do Planalto Meridional (São José dos Pinhais/Guaricana, Indaial, Campo Belo do Sul, Luiz Alves e Dr. Pedrinho).

O resultado da rede de haplótipos do grupo *Oxymycterus aff. quaestor* (Figura 13) a inclui na Categoria II (*Deep gene tree*), proposta por Avise (2000), onde as linhagens amplamente simpátricas, com elevadas diferenças genéticas, mas que ocupam mesmo intervalo (Distribuição geográfica), pode ser explicada devido a dois processos básicos: Barreiras ao fluxo gênico e miscigenação recente entre as populações / espécies. O acúmulo de mutações, possivelmente fixadas por deriva devido ao efeito fundador, que acompanha o comportamento de dispersão e/ou a perda de haplótipos intermediários ao longo das gerações podem explicar o acúmulo de diferenças entre o H18 e o H25, com 46 passos mutacionais e nove vetores intermediários.

Observando uma diversidade nucleotídica total ( $\pi$ ) de 0,03853 e uma diversidade haplotípica total ( $H_d$ ) de 0,89363 (Tabela 8), os 59 haplótipos apresentam altos valores de  $H_d$  e baixos valores de  $\pi$  encontrados para os dois clados, o que indica que ocorreu expansão demográfica após um período de baixo ou estável tamanho efetivo populacional. Segundo Nei e Li (1979), o índice de diversidade nucleotídica é menos influenciável pelo tamanho amostral, tornando-o mais adequado para a comparação da variabilidade genética entre populações ou espécies diferentes. Os valores negativos, mas não significativos obtidos para o teste  $D$  de Tajima para a amostragem como um todo e para os Clados 1 e 2 sugerem excesso de alelos raros para estas populações, indicando um processo de expansão populacional recente (TAJIMA, 1993). Como os testes de neutralidade  $D$  de Tajima e  $F_s$  de Fu não foram significativos ( $p > 0,01$ ) para as populações analisadas, não se rejeita a hipótese de mutação neutra.

No entanto as análises utilizadas para estimar a diferenciação populacional a partir da variância das frequências haplotípicas verificou um índice de fixação  $G_{ST}$  de 0,04. Tal resultado indica que há baixa estruturação entre estas populações, o que explicaria a ocorrência simpátrica entre os dois clados em questão. Entretanto, vale lembrar que no presente estudo foi utilizado um marcador de herança matrilinear, o gene mitocondrial citocromo *b*, e que apesar de ser amplamente utilizado em estudos filogeográficos, e principalmente em trabalhos com filogenia em roedores, inferências sobre fluxo gênico são inconsistentes, devido a este genoma organelar não apresentar, até que seja elucidado este tema pela ciência, mecanismos de recombinação efetivos, tal como os genes nucleares. Os resultados de divergência genética encontrados para este grupo em questão (aff. *quaestor*) estão apresentados na Tabela 7. Foram encontradas distâncias entre os Clados, 1 e 2, com variação de 9,06%, desvio padrão (DP)  $\pm 1,67\%$ .

Com relação aos valores de divergência interclados (considerando a espécie válida mais basal), o Clado 2 e *O. quaestor* apresentaram 2,58% (DP $\pm 0,09\%$ ), e entre o Clado 1 e *O. quaestor* 10,33% (DP $\pm 1,8\%$ ). No entanto, propostas de valores de corte de divergência genética para tornar possível a diferenciação entre potenciais espécies ou populações têm sido levantadas por alguns autores. Bradley e Baker (2001), por exemplo, em estudos utilizando o cyt *b*, em mamíferos de pequeno porte, sugerem que valores de divergência menores do que 2% indicam variação intraespecífica, e que valores entre 2 e 11% tem grande probabilidade de serem indicativos de populações coespecíficas ou de

espécies válidas, e indicam a necessidade de estudos mais amplos sobre seu status taxonômico. Ainda, considerando valores de divergência superiores a 11% seria um indicador para o reconhecimento pleno de espécies. Considerando outro marcador mitocondrial, o COI (citocromo oxidase subunidade I), a região intitulada 'DNA *Barcode*', Hebert *et al.* (2003) argumentam um valor de 3% de corte para as divergências genéticas. Tal argumento levanta a ideia de que valores inferiores a 3% apontariam indivíduos de uma mesma espécie e, valores superiores à linha de corte indicariam a presença de espécies diferentes.

Avise (2000), especifica que em estudos filogeográficos, as divergências intraespecíficas raramente são maiores do que 2% e frequentemente são menores do que 1%. Contudo, os valores de divergência genética encontrados entre clados 1 e 2, do grupo *aff. quaestor*, determinado pela inferência bayesiana, não correspondem aos padrões de variação sugeridos acima, o que seria um forte indicativo para a discriminação de unidades biológicas distintas. Entretanto, autores já citados como Hoffman *et al.* (2002) e Jayat *et al.* (2008), utilizando o mesmo marcador proposto, incluindo a espécie mais basal (*O. quaestor*), de acordo com a inferência bayesiana, revelaram distâncias genéticas de 2,8% e 2,88%, respectivamente, entre diferentes espécies deste gênero de distribuição geográfica simpátrica.

Porém, deve-se levar em consideração que a utilização de apenas dados moleculares pode não contemplar totalmente a questão de delimitação de espécies. Os dados moleculares seriam altamente informativos, quando combinados com outros tipos de parâmetros, como medidas morfológicas, características ecológicas e a análise das distribuições geográficas, tornando-se efetivamente robustos (BICKFORD *et al.*, 2007). Portanto, uma análise criteriosa da morfologia, utilizando medidas craniométricas, por exemplo, combinada com a adição de sequências nucleares ao conjunto de dados poderia dar maior suporte a uma possível separação do clado 1 e 2, discutidos neste trabalho, e que neste caso podem sugerir um complexo de espécies crípticas.

## 7.2 *Oxymycterus nasutus*

A espécie *Oxymycterus nasutus* (Waterhouse, 1837), segundo a literatura ocorre desde o Uruguai a toda porção leste do sul e sudeste do Brasil (do Rio Grande do Sul a



São Paulo), cuja localidade tipo é Uruguai, Departamento de Maldonado, Maldonado (WILSON e REEDER, 2005). De acordo com Oliveira (1998), no Brasil ocorre do estado do Rio Grande do Sul, desde o nível do mar até altitudes elevadas da Serra Geral, até os estados de Santa Catarina e Paraná, onde está restrito às altitudes elevadas das montanhas costeiras (Figura 14).

Do total de 181 amostras deste estudo, a maior parte (n=115) dos espécimes, de acordo com Inferência Bayesiana (Figura 15 a2), são pertencentes à espécie *Oxymycterus nasutus*. Devido ao suporte nodal mostrado na figura 15 a2 (PPB = 1), formando um único Clado, a coerência dos pontos amostrados com a literatura existente da distribuição da espécie (Figura 14) e demais análises para índices de diversidade genética, resultados de testes de neutralidade (Tabela 10) e distância genéticas intraespecíficas, dos espécimes amostrados, fornece suporte a essa identificação molecular. No entanto, verifica-se a existência de dois polos (gradientes) de distribuição: um entre os espécimes coletados no Planalto Meridional (Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul) e outra coletada na Planície Costeira (Litoral do Rio Grande do Sul). Adicionalmente, as análises revelam uma distância genética com base no *cyt b* intraespecífica de 1,34% entre as linhagens de Planalto Meridional e Planície Costeira, considerando assim, uma espécie com duas linhagens.

Entretanto, apesar da distância genética intraespecífica ficar abaixo dos parâmetros propostos por Bradley e Baker (2001) e Avise (2000), ou seja, inferiores a 2%, a estimativa de diferenciação populacional a partir da variância das frequências alélicas verificou um índice de fixação  $G_{ST}$  de 0,09, o que indica não haver estruturação populacional nesta espécie. Tal indicador pode ser observado na Figura 15 a2, onde os haplótipos, de Planalto Meridional como de Planície Costeira, se intercalam dentro do clado fornecido pela Inferência Bayesiana.

Para explorar tal problemática, a rede de haplótipos construída através de *median-joining* do *O. nasutus*, deste estudo, gerou 31 haplótipos (Figura 17), tendo destaque ao seu padrão de distribuição entre o Planalto Meridional e a Planície Costeira (Figura 16), sendo a única espécie, de acordo com a amostragem deste trabalho, com distribuição em região da Planície Costeira. Apesar da análise filogenética não apontar uma estruturação, a rede haplotípica evidencia uma separação entre os haplótipos de Planalto e da Planície.

A linhagem de Planalto revelou 15 haplótipos, incluindo a presença dos haplótipos H18 (com 21 espécimes) e o H08 (17 espécimes). Possivelmente sendo os haplótipos mais antigos por estarem no centro da rede e geograficamente dispersos, enquanto os haplótipos mais novos estão no extremo da rede e geograficamente restritas. O H18 corresponde às localidades de Piraquara, Mata da Várzea e São José dos Pinhais/Barro Preto (PR) e o H08 as localidades de Cambará do Sul (Parque Nac. dos Aparados da Serra), Pró-Mata/São Francisco de Paula e São Lourenço do Sul (RS). Entretanto o haplótipo H08 foi o único haplótipo compartilhado entre as linhagens de Planalto e Planície. São Lourenço do Sul (RS) foi a única localidade que apresentou haplótipos nas duas linhagens Planalto e Planície, sendo H08 e H24, respectivamente. O haplótipo H24, além de presente em São Lourenço do Sul contempla as localidades de Tapes e HBITL-Pelotas, e está estreitamente relacionado com os haplótipos referente às localidades de Camaquã (H09 e H10), Barra do Ribeiro e Guaíba (H12), Cristal/Camaquã/Barra do Ribeiro (H04), além de um haplótipo de Pelotas (H25).

A linhagem de Planície evidenciou 16 haplótipos, sendo o H12 com 17 espécimes compartilhando-o, todos amostrados em Guaíba e Barra do Ribeiro (RS). As demais localidades e haplótipos da linhagem de planície estão presentes na Tabela 11 (do ponto “o” ao “z”).

O resultado da rede de haplótipos de *O. nasutus* sugere que ela seja incluída na Categoria III, proposta por Avise (2000), que linhagens que são intimamente relacionadas, porém geograficamente alopátricas (separadas geograficamente), e que pode ser explicada por dois processos: fluxo gênico recente e/ou contato histórico recente.

O total amostral, apresentou diversidade nucleotídica total ( $\pi$ ) de 0,01030 e uma diversidade haplotípica total ( $H_d$ ) de 0,90831 (Tabela 10). Os altos valores de diversidade haplotípica e baixos valores de diversidade nucleotídica encontrados indicam que ocorreu expansão demográfica após um período de baixo tamanho populacional efetivo.

Os valores negativos, mas não significativos obtidos para o teste  $D$  de Tajima (Tabela 10) para toda amostragem sugerem excesso de alelos raros para estas populações, indicando um processo de expansão populacional recente (TAJIMA, 1993). Como os testes de neutralidade  $D$  de Tajima e  $F_s$  de Fu não foram significativos ( $p > 0,01$ ) para nenhuma das populações analisadas, não se rejeita a hipótese de mutação neutra. Considerando as localidades do Bioma Pampeano (Planície) e do Planalto Meridional

apresentam marcadas diferenças relativas aos domínios vegetação e aspectos geomorfológicos (VIEIRA, 1984; ROISENBERG e VIERO, 2000; TOMAZELLI e VILLWOCK, 2000), as amostras de Planalto Meridional (Mata Atlântica) procedem de regiões relativamente elevadas, atingindo cotas superiores a 900 m como na localidade de São Francisco de Paula, RS. Com exceção do ponto amostral “k” (Tabela 1), apontada como pertencente a Floresta Ombrófila Densa (FOD), e os pontos “m e n” ponto de transição entre Biomas, sendo a predominante a Mata Atlântica (Florestas Ombrófila Mista - Floresta Estacional) e o Pampa, o ponto “i” como de Floresta estacional, todos os demais pontos amostrais são definidos como de Planalto Meridional e de Floresta Ombrófila Mista (Florestas de Araucárias). Os espécimes amostrados no Bioma Pampa, de *O. nasutus*, no presente estudo, são oriundos de locais de Planície Costeira e borda do escudo Rio-Grandense, sendo ambas regiões definidas como tendo baixas cotas altimétricas (VIEIRA, 1984). Alguns autores sugerem que gradientes de altitude podem estar associados a processos de diferenciação em pequenos roedores (REIG, 1984; MONTGELARD e MATTHEE, 2012), e este fator pode também estar associado ao processo interno de diferenciação em *O. nasutus*. Também não devem ser descartados os efeitos das dissimilaridades estruturais do habitat, fatores também relacionados a processos de divergência morfológica em pequenos mamíferos (ABIADH *et al.*, 2010; LALIS *et al.*, 2009).

Gonçalves e Oliveira (2004) relatam que esta espécie possui uma relação com o *O. dasytrichus*. Hoffman *et al.* (2002) utilizando marcadores mitocondriais evidencia que as espécies *O. nasutus*, *O. dasytrichus*, *O. delator* e *O. amazonicus* formem um único grupo. Tais dados são corroborados pela inferência filogenética deste trabalho.

### 7.3 *Oxymycterus dasytrichus*

O *Oxymycterus dasytrichus* (Schinz, 1821), de acordo com Oliveira (1998) possui uma distribuição nos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais ao extremo leste de Goiás, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo, desde as planícies costeiras até altitudes em torno de 2.000 m em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. A localidade tipo é na Bahia, Rio Mucuri (Figura 18).

De acordo com Bonvicino (2008), esta espécie não é de ocorrência no sul do Brasil, porém, a amostragem deste estudo, e com base na inferência Bayesiana coloca seis sequências da amostragem como pertencentes a esta espécie (Figura 19 a3), com um suporte nodal igual a 1 (PPB = 1). Uma vez que esta espécie possui uma distribuição ao longo de praticamente todo o Bioma da Mata Atlântica, no qual se inclui o litoral do estado do Paraná e Santa Catarina, estas seis sequências obtidas, oriundas das localidades de Marumbi/Bacia do Rio do Nunes (1), Guaraqueçaba/Índios (3), Guaraqueçaba/Massarapuã (1), no Paraná, e Itapoá (1) em Santa Catarina (Figura 20), não se diferenciam das sequências desta espécie disponíveis no GenBank (Figura 19 a3), pertencendo todas a um mesmo clado.

Além disso, a distância genética intraespecífica observada, entre os *vouchers* e as seis sequências amostradas ficou em 0,96%. Hoffman *et al.* (2002) relata uma distância intraespecífica de 1,3% em *O. dasytrichus*. Contudo, considerando o suporte nodal da filogenia (PPB =1), a distância intraespecífica em torno 1%, e um bioma de ocorrência sendo o mesmo da literatura disponível relata, coloca-se estas seis sequências como pertencente à espécie *O. dasytrichus*.

Gonçalves e Oliveira (2004), em comparações entre espécimes amostrados na Bahia e no sudeste Brasileiro, retratam uma diferença intraespecífica entre 6,3-7,5%, utilizando o mesmo marcador (cyt b). Contudo, estes mesmos autores comentam que as populações do norte (Bahia) e do sul (sudeste) desta espécie pode ter passado algum nível de isolamento geográfico, ainda desconhecido, resultando em uma quantidade moderada de diferenciação genética entre eles. Porém, estes mesmos autores, considerando apenas a distância genética intraespecífica de uma mesma população desta espécie, encontraram valores entre 0,9-2,3%. Os mesmos autores ainda discutem a existência de uma diferenciação ao longo do eixo norte-sul de distribuição geográfica, o que pode levar a diferentes níveis de distâncias genéticas.

Além disso, a figura 19 A3 também mostra que o clado do *O. dasytrichus* irmão do clado formado por *O. delator* e *O. amazonicus*, com um suporte nodal de 0,94 (PPB =1 = 0,94). Tal resultado corrobora com as inferências filogenéticas de Hoffman *et al.* (2002) que colocam o *O. dasytrichus* como clado-irmão de *O. delator* e *O. amazonicus*. Jayat *et al.* (2008) também ilustra resultados concordantes.

#### 7.4 *Oxymycterus* sp.

A figura 19 a3, além de evidenciar a existência de *O. dasytrichus* para o sul do Brasil, levanta uma outra questão com o clado-irmão desta espécie. Autores como Hoffman *et al.* (2002) e Jayat *et al.* (2008), revelaram em seus resultados *O. delator* e *O. amazonicus* como espécies irmãs. Na figura 19 A3, a filogenia deste trabalho corrobora com os resultados destes autores. Porém, a amostra P495, da localidade de Jaguariaíva/Fazenda Chapada do Santo Antônio (Figura 21), mostra uma relação imprecisa com as sequências de *O. delator* e *O. amazonicus* disponíveis no banco de dados.

De acordo com a literatura, *Oxymycterus delator* (Thomas, 1903) possui uma distribuição nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Piauí (OLIVEIRA, 1998). Geograficamente, *Oxymycterus amazonicus* (Hershkovitz, 1994) é distribuído no Baixo Rio Amazonas, incluindo as regiões baixas dos Rios Tocantins, Xingu e Tapajós, estendendo-se ao longo dos tributários do Médio e Alto Rio Aripuanã e Tapajós até o noroeste do estado de Mato Grosso, pelo menos até o limite sul da Serra do Norte (Serra dos Parecis) e a oeste até o Rio Jamari no estado de Rondônia (BONVICINO, 2008).

Assim, conforme a Figura 21, a localidade em que fora amostrada este espécime, pertence ao Bioma Cerrado, presente numa pequena porção do estado do Paraná. A princípio, estas duas espécies relacionadas com a amostra P495, possuem uma distribuição simpátrica em algumas localidades. Porém, de acordo com a literatura, estas regiões de simpatria não condizem à região onde fora amostrada. Embora a amostra P495 possua um suporte nodal igual a 1, a filogenia proposta neste trabalho a coloca como “espécie irmã” do clado *O. delator* + *O. amazonicus*. Entretanto vale ressaltar que se trata de apenas um exemplar, e a única amostra pertencente ao Bioma Cerrado neste trabalho, apresentando uma relação imprecisa entre as espécies *O. delator* e *O. amazonicus*, o que pode por em questão a identificação destas duas amostras depositadas ou mesmo potencial espécie única com grande variação morfológica e/ou genética, o que necessita ser investigado, e que posteriores amostragens mais abrangentes são necessárias para elucidar a problemática deste clado.

## 8 CONCLUSÃO

Conclui-se no presente trabalho que:

- Foi possível apresentar uma filogenia para este gênero utilizando espécimes amostrados no Sul do Brasil, e considerando a quantidade de pontos amostrais e indivíduos utilizados, a árvore gerada revela que nem todas as espécies propostas pela literatura para a região Sul do Brasil de fato ocorrem na região;
- Considerando a amostragem deste estudo no sul do Brasil, e com base na inferência bayesiana, as espécies e/ou entidades biológicas deste gênero no sul do Brasil são: *Oxymycterus* aff. *quaestor*, *Oxymycterus nasutus*, *Oxymycterus dasytrichus* e *Oxymycterus* sp. (P495);
- A princípio as espécies e/ou entidades biológicas *Oxymycterus* aff. *quaestor* e *Oxymycterus nasutus* são simpátricas, pelo menos, aos domínios da Mata Atlântica do sul do Brasil;
- O *Oxymycterus* aff. *quaestor* deste estudo apresentou dois clados distintos que ocorrem de forma simpátrica ao longo do Planalto Meridional (Mata Atlântica), entretanto a inferência bayesiana não rejeita a hipótese que um destes clados pertençam a espécie *Oxymycterus quaestor*, devido ao baixo suporte nodal evidenciado, e a outra seja representativa de uma espécie críptica (nova);
- O *Oxymycterus nasutus* fora a única espécie que os resultados corroboram como sendo de ocorrência para o Sul do Brasil. Além disso, a rede haplotípica mostra a ocorrência de duas linhagens, uma no Planalto Meridional (Mata Atlântica) e outra em Planície Costeira/RS (Pampa), embora a inferência bayesiana e demais parâmetros não promovam uma estruturação sólida nesta espécie com base em um único marcador;

- O *Oxymycterus dasytrichus* de acordo com a filogenia proposta aparece como espécie ocorrente na região sul do Brasil, em especial ao litoral do Paraná e Santa Catarina. Esta é uma novidade ao padrão de distribuição desta espécie ao longo da Mata Atlântica;
- O *Oxymycterus* sp. (P495) embora limitada a uma única amostra, revelou uma posição taxonômica inesperada na árvore gerada, apresentando uma relação entre *O. delator* e *O. amazonicus*.

## 9 REFERÊNCIAS

- AB'SABER, A. N. Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil. **Orientação**, São Paulo, n. 3, p. 45-48. 1969.
- ABIADH, A.; COLANGELO, P.; CAPANNA, E.; LAMINE-CHENITI, T.; CHETOUI, M. Morphometric analysis of six *Gerbillus* species (Rodentia, Gerbillinae) from Tunisia. **Comptes Rendus Biologies**, 333:680—687. 2010.
- ADKINS, R. M.; GELKE, E. L.; ROWE, D.; HONEYCUTT, R. L. Molecular Phylogeny and Divergence Time Estimates for Major Rodent Groups: Evidence from Multiple Genes. **Molecular Biology and Evolution**. 18(5):777–791, 2001.
- ALARCÓN, O.; D'ELÍA, G.; LESSA, E. P.; PARDIÑAS, U. F. J. Phylogeographic Structure of the Fossorial Long-Clawed Mouse *Chelemys macronyx* (Cricetidae: Sigmodontinae) **Zoological Studies** 50(5): 682-688, 2011.
- ALEXANDER, A. R. A Rodent as Big as a Buffalo. **Science** 301, 1678-9, 2003.
- AVISE, J. C. Phylogeography: The History and Formation of Species. **Harvard University Press**, Cambridge, Massachusetts. 2000.
- AVISE, J.C. Molecular markers, natural history and evolution. **Chapman & Hall**, Inc.; USA. 511p. 1994.
- AVISE, J.C.; ARNOLD, J.; BALL, R.M.Jr.; BERMINGHAM, E.; LAMB, T., NEIGEL, J.E.; REEB, C.A. & SAUNDERS, N.C. Intraespecific phylogeography: The mitochondrial DNA bridge between population genetics and systematics. **Annual Review of Ecology and Systematics**, 18: 489 – 522, 1987.
- BANDELT, H-J.; FORSTER, P.; RÖHL, A. Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies. **Molecular Biology and Evolution**. 16:37-48. 1999.
- BARROS-BATTESTI, D. M.; ARZUA, M.; LINARDI, P. M.; BOTELHO, J. R.; SBALQUEIRO, I. J. Interrelationship between ectoparasites and wild rodents from Tijucas do Sul, state of Paraná, Brazil. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz** 93: 719-725. 1998.
- BASKIN, J. A. Bensonomys, Calomys, and the origin of the phyllotine group of Neotropical cricetines (Rodentia, Cricetidae). **Journal of Mammalogy**. 59:125–135. 1978.
- BIANCHI, N. O.; REIG, O. A.; MOLINA, O. J. & DULOUT, F. N. Cytogenetics of the south american Akodont rodents (Cricetidae). In. A progress report of argentinian and venezuelan forms. **Evolution**, 25: 724-736, 1971.
- BICKFORD, D.; LOHMAN, D. J.; SOHDI, N. S.; PETER, Ng. K. L.; MEIER, R.; WINKER, K.; KRISTA, I. K.; DAS, I. Cryptic species as a window on diversity and conservation. **Trends in Ecology and Evolution** 22: 148-155. 2007.



BONVICINO, C. R. **Guia dos Roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos**. C. R. Bonvicino, J. A. Oliveira, P. S. D'Andrea. - Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, 2008.

BONVICINO, C.R.; PENNA-FIRME, V.; SEUÁNEZ, H.N. The karyotype of *Bucephalus griseus* Herzkovitz, 1998 (Rodentia, Sigmodontinae) with comments on distribution and taxonomy. **Journal of Mammalogy**. Biology, v. 63, p. 329-335, 1998.

BONVICINO, C.R.; LEMOS, B., WEKSLER, M. Small mammals of chapada dos Veadeiros National Park (Cerrado of Central Brazil): Ecologic, Karyologic, and Taxonomic Considerations. **Brazilian Journal of Biology**. v.65 n.3p. 395- 406, 2005.

BONVICINO, C.R.; MOREIRA, M. A. M. Molecular Phylogeny of the Genus *Oryzomys* (Rodentia: Sigmodontinae) Based on Cytochrome *b* DNA Sequences. **Molecular Phylogenetics and Evolution**. Vol. 18, No. 2, February, pp. 282–292, 2001.

BOORE, J. L. Animal mitochondrial genomes. *Nucleic Acids Research*, Vol. 27, No. 8 **Oxford University Press**, 1999.

BOUCKAERT, R. R.; HELED, J.; KUEHNERT, D.; VAUGHAN, T. G.; WU, C-H.; XIE, D.; SUCHARD, M. A.; RAMBAUT, A.; DRUMMOND, A. J. BEAST 2: A software platform for Bayesian evolutionary analysis. **PLoS Computational Biology**. 10 (4): e1003537. 2014.

BRADLEY, R. D.; R. J. BAKER. A test of the genetic species concept: cytochrome-b sequences and mammals. **Journal of Mammalogy** 82: 960-973. 2001.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de controle de roedores. - Brasília: Ministério da Saúde, **Fundação Nacional de Saúde**, 2002.

BROWN, W. M.; GEORGE, M. J.; WILSON, A. C. Rapide evolution of animal mitochondrial DNA. **Proceedings of the National Academy of Sciences**. USA, 76: 1967-1971. 1979.

BURMEISTER, H. **Systematische uebersicht der Thiere Brasiliens, welche wa'hrend einer Reise durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Gerae's gesammelt oder beobachtet wurden**. Georg Reimer, Berlin, Germany, 1854.

CABRERA, A. Catalogo de los mamíferos de América del Sur. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia,"* **Ciencias Zoológicas** 4:309–732, 1961.

CAMARGO, N. F. de.; GURGEL-GONÇALVES, R.; PALMA, A. R. T. Variação Morfológica de pegadas de Roedores arborícolas e cursoriais do Cerrado. **Revista Brasileira de Zoologia** 25 (4): 696-704, Dezembro, 2008.

CARLETON, M. D. A survey of gross stomach morphology in New World *Cricetinae* (Rodentia, Muroidea), with comments on functional interpretations. **Miscellaneous Publications Museum of Zoology**, University of Michigan 146: 1-43, 1973.

COSTA, B. M. de A.; GEISE, L.; PEREIRA, L. G. G.; COSTA, L. P. Phylogeography of *Rhipidomys* (Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae) and description of two new species from southeastern Brazil. **Journal of Mammalogy**. 92(5):945-962. 2011.

CRPM, **Mapa geodiversidade do Brasil**: Brasília: CPRM/SGM/MME. 2008.

CRPM, **Mapa geodiversidade do Brasil**: escala 1:2. 500. 000. Legenda expandida. Brasília: CPRM/SGM/MME. 68 p. il. 2006.

D'ÉLIA, G. Phylogenetics of Sigmodontinae (Rodentia, Muroidea, Cricetidae), with special reference to the Akodont group, and with additional comments on historical Biogeography. **Cladistics**, (19) 307-323. 2003.

D'ELÍA, G. comments on recent advances in understanding sigmodontine phylogeny and evolution. **Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.** 7(1):47-54, 2000.

D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J. Systematics of Argentinean, Paraguayan, and Uruguayan swamp rats of the genus *Scapteromys* (rodentia, cricetidae, sigmodontinae). **Journal of Mammalogy**, 85(5):897–910, 2004.

D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J.; TETA, P.; PATTON, J.L. Definition and diagnosis of a new tribe of sigmodontine rodents (Cricetidae: Sigmodontinae), and a revised classification of the subfamily. **Gayana** 71(2):187–194, 2007.

D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J.; JAYAT, P.; SALAZAR-BRAVO, J. Systematics of *Necomys* (Rodentia, Cricetidae, Sigmodontinae): species limits and groups, with comments on historical biogeography. **Journal of Mammalogy**, 89(3):778–790, 2008.

DRUMMOND, A. J.; RAMBAUT, A. Beast: Bayesian evolutionary analysis by sampling trees. **BMC Evolutionary Biology** 7: 214. doi: 10.1186/1471-2148-7-214. 2007.

EMMONS, L.; FEER, F. Neotropical rainforest mammals: a field guide. 2ª Ed. **University of Chicago Press**, Chicago. 396p., 1997.

ENGEL, S. R.; HOGAN, K. M.; TAYLOR, J. F.; DAVIS, S. K. Molecular systematics and paleobiogeography of the South American Sigmodontinae Rodents. **Molecular Biology and Evolution**. 15: 35-49, 1998.

FABRE, P-H.; HAUTIER, L.; DIMITROV, D.; DOUZERY, E. J. P. A glimpse on the pattern of rodent diversification: a phylogenetic approach. **BMC Evolutionary Biology**, 12:88. 2012.

FELDHAMER, G. A.; DRICKAMER, L. C.; VESSEY, S. H.; MERRITT, J. F. Mammalogy. Adaptation, Diversity, and Ecology. **WCB McGraw-Hill**, Boston. 563pp. 1999.

FLYNN, L. J.; JACOBS, L. L.; CHEEMA, I. U. Baluchimyinae, a new ctenodactyloid rodent subfamily from the Miocene of Baluchistan. **American Museum Novitates**, 2841:1-58, 1986.

FOOTE, M.; HUNTER, J. P.; JANIS, C. M.; SEPKOSKI, J. J. Jr. Evolutionary and preservational constraints on origins of biologic groups: divergence times of eutherian mammals. **Science** 283:1310–1314, 1999.

FU, Y. Statistical tests of neutrality of mutations against population growth, hitchhiking and background selection. **Genetics** 147: 915–925 9335623. 1997.

GARDNER, A.L.; PATTON, J.L. Karyotypic variation in oryzomyine rodents (Cricetinae) with comments on chromosomal evolution in the Neotropical Cricetinae complex. **Occasional Papers**, Museum of Zoology, University of Michigan, 49:1-48, 1976.

GEISE, L.; SMITH, M.F.; PATTON, J. L. Diversification in the genus Akodon (Rodentia, Sigmodontinae) in Southeastern South America: mitochondrial DNA sequence analysis. **Journal of Mammalogy** 82(1): 92-101. 2001.

GONÇALVES, P.R., OLIVEIRA, J. A. de. Morphological and Genetic Variation between Two Sympatric Forms of *Oxymycterus* (Rodentia: Sigmodontinae): An Evaluation of Hypotheses of Differentiation within the Genus. **Journal of Mammalogy** 85(1):148-161. 2004.

GONÇALVES, P. R.; OLIVEIRA, J. A. de.; CORRÊA, M. O.; PESSOA, L. M. Morphological and cytogenetic analyses of *Bibimys labiosus* (Winge, 1887) (Rodentia, Sigmodontinae): implications for its affinities with the scapteromyine group. **University of California Publications in Zoology**. Volume 13. 175-209p. 2005.

GREGOROVÁ, S.; DIVINA, P.; STORCHOVA, R.; TRACHTULEC, Z.; FOTOPULOSOVA, V.; SVENSON, K. L.; FOREJT, J. (Mouse consomic strains: Exploiting genetic divergence between *Mus m. musculus* and *Mus m. domesticus* subspecies. **Genome Research**, 18(3), 509–515, 2008.

GRIVELL, L. A. Mitochondrial DNA. **Scientific American**. 248:78–89, 1983.

HASS, I. Análise filogenética por pintura cromossômica multicolor, em roedores da tribo Akodontini (Rodentia, Cricetidae), ocorrentes na região sul do Brasil. Curitiba. **Tese de Doutorado**. Departamento de Biologia, Universidade Federal do Paraná, 2006.

HAUSWITH, W. W.; LAIPIS, P. J. Transmission genetics of mammalian mitochondria: A molecular model and experimental evidence. In: Quagliariello C, Slater EC, Palmieri F et al. (eds) **Achievements and Perspectives in Mitochondrial Research**. New York: Elsevier, pp 49–60, 1986.

HEBERT, P. D. N.; RATNASINGHAM, S.; DEWAARD, J.R. Barcoding animal life: Cytochrome *c* oxidase subunit 1 divergences among closely related species. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**. 270: S596–S599. 2003.

HERSHKOVITZ, P. **Mice, land bridges and Latin American faunal interchange. Ectoparasites of Panama**. P 725-751. Field Museum of History Natural, Chigago. 1966.

HERSHKOVITZ, P. Report on some sigmodontinae rodents collected in southeastern Brazil with descriptions of a new genus and six new species. **Bonner Zoologische Beiträge**, 47: 193-256. 1998.

HERSHKOVITZ, P. The Recent mammals of the Neotropical region: a zoogeographic and ecologic review. In: Evolution, mammals, and southern continents (A. KEAST, F. C. ERK, and B. GLASS, eds.). **State University of New York Press**, Albany. 311–431, 1972.

HERSHKOVITZ, P. The description of a new species of South American hocicudo, or long-nose mouse genus *Oxymycterus* (Sigmodontinae, Muroidea), with a critical review of the generic content. **Fieldiana: Zoology (New Series)** 1460:1–43, 1994.

HICKMAN JR, C.P.; ROBERTS, L.S.; LARSON, A. **Princípios integrados de zoologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan SA, 2004.

HOFFMANN, F. G.; LESSA, E. P.; SMITH, M. F. Systematics of *Oxymycterus* with description of a new species from Uruguay. **Journal of Mammalogy**. 83(2): 408-420. 2002.

HUCHON, D.; MADSEN, O.; SIBBALD, M.J.; AMENT, K.; STANHOPE, M. J.; CATZEFLIS, F.; de JONG, WW.; DOUZERY, E.J. Rodent phylogeny and a timescale for the evolution of Glires: evidence from an extensive taxon sampling using three nuclear genes. **Molecular Biology and Evolution**. Jul; 19(7):1053-65, 2002.

HUCHON, D.; CATZEFLIS, F. M.; DOUZERY, E. J. P. Variance of molecular datings, evolution of rodents and the phylogenetic affinities between Ctenodactylidae and Hystricognathi. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**. B 22, vol. 267 no. 1441 393-402, 2000.

HUCHON, D.; DOUZERY, E. J. P. From the Old World to the New World: a molecular chronicle of the phylogeny and biogeography of hystricognath rodents. **Molecular Phylogenetics and Evolution** 20(2):238-251, 2001.

JACOBS, L. L.; PILBEAM, D. Of Mice and Men - Fossil-based divergence dates and molecular clocks. **Journal of Human Evolution** 9:551-555, 1980.

JAYAT, J.P.; D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J.; MIOTTI, M.D.; ORTIZ, P.E. A new species of the genus *Oxymycterus* (Mammalia: Rodentia: Cricetidae) from the vanishing Yungas of Argentina. **Zootaxa** 1911: 31–51, 2008.

JONSSON, C. B.; FIGUEIREDO, L. T.; VAPALAHTI, O. A global perspective on hantavirus ecology, epidemiology, and disease. **Clinical Microbiology Reviews (CMR)**. Rev 23, 412–441, 2010.

KIMURA, M. A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. **Journal of molecular evolution** 16: 111–120. 1980.

KUMAR, S.; HEDGES, S. B. A molecular timescale for vertebrate evolution. **Nature**. Apr 30; 392 (6679):917-20, 1998.

LALIS, A.; BAYLAC, M.; COSSON, J. F.; MAKUNDI, R. H.; MACHANG'U, R. S.; DENYS, C. Cranial morphometric and fine scale genetic variability of two adjacent *Mastomys natalensis* (Rodentia: Muridae) populations. **Acta Theriologica**. 542:171–181. 2009.

LANGGUTH, A. **Mamíferos. Lista de las especies de vertebrados del Uruguay. Museo Nacional de Historia Natural and Departamento de Zoología Vetebrados**, Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo, Uruguay, 1976.

LANGGUTH, A.; ANDERSON, S. **Manual de identificación de los mamíferos del Uruguay. Montevideo, Departamento de Zoología de los Vertebrados**. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 1980.

LI, W. H.; WU, C. I. Rates of Nucleotide Substitution Are Evidently Higher in Rodents than in Man. **Molecular Biology and Evolution**. 4(1):74-77, 1987.

LI, W-H.; GRAUR, D. **Fundamentals of molecular evolution**. 2.ed. Sinauer Associates (ed) Sunderland Massachusetts, 2000.

LIASCOVICH, R. C.; REIG, O. A. Low chromosomal number in Akodon cursor montensis (Thomas), and karyologic confirmation of Akodon serrensis (Thomas) in Misiones, Argentina. **Journal of Mammalogy**, (70) 391–395. 1989.

MAACK, R. Breves notícias sobre a geologia dos estados do Paraná e Santa Catarina. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, Curitiba, v. 2, art. 7, pp. 63-157. 1947.

MARGULIS, L. **Symbiosis in Cell Evolution**. New York: WH Freeman and Co.1981.

MARSHALL, L. G. A model for paleobiogeography of South American cricetine rodents. **Paleobiology**, 5: 126-132, 1979.

MARTIN, Y.; GERLACH, G.; SCHLÖTTERER, C.; MEYER, A. Molecular phylogeny of European muroid rodents based on complete cytochrome b sequences. **Molecular Phylogenetics and Evolution** 16(1):37-47. 2000.

MAYR, E.; ASHLOCK, P. D. **Principles of systematic zoology**. 2nd ed. McGraw-Hill, Inc., New York, 1991.

MacDONALD, D. **The Encyclopedia of Mammals**. Andromeda Oxford limited. 1<sup>a</sup> Edition. 21-89, 1999.

MELÉNDEZ, B. **Paleontologia**. Tomo 3. Volume 1. Editorial Paraninfo S. A. 1-451, 1990.

MELLO, D. A.; TEIXEIRA, M. L. Infecção experimental de *Calomys callosus* (Rodentia-Cricetidae) com *Leishmania donovani* chagasi (Laison, 1982). **Revista Saúde Pública**. vol.18, n.4 pp. 337-341, 1984.

MIYAKI, C. Y. Filogeografia e a descrição da diversidade genética da fauna brasileira. **Megadiversidade**, Volume 5, Nº 1-2. 2009.

MIRANDA, G. B.; OLIVEIRA, L. F. B.; ANDRADES-MIRANDA, J.; LANGGUTH, A.; CALLEGARI-JACQUES, S.M.; MATTEVI, M.S. Phylogenetic and Phylogeographic Patterns in Sigmodontine Rodents of the Genus *Oligoryzomys*. **Journal of Heredity** 100(3):309–321, 2009.

MONTES, M. A.; OLIVEIRA, L.F.; BONATTO, S.L.; CALLEGARI-JACQUES, S.M.; MATTEVI, M.S. DNA sequence analysis and the phylogeographical history of the rodent *Deltamys kemp*i (Sigmodontinae, Cricetidae) on the Atlantic Coastal Plain of south of Brazil. **Journal of Evolution Biology** 21: 1823–1835. 2008.

MONTGELARD, C.; MATTHEE, A. C. Tempo of genetic diversification in southern African rodents: The role of Plio-Pleistocene climatic oscillations as drivers for speciation. **Acta Oecologica**. 42: 50–57. 2012.

MÜLLER, L.; GONÇALVES, G. L.; CORDEIRO-ESTRELA, P.; MARINHO, J. R.; ALTHOFF, S. L.; ET AL. DNA Barcoding of Sigmodontine Rodents: Identifying Wildlife Reservoirs of Zoonoses. **PLoS ONE** 8(11): e80282. 2013.

MUSSER, G. G.; CARLETON, M. D. *Superfamily Muroidea*. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.). *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*. 3. ed. Baltimore: **John Hopkins University Press**, v. 2, p. 894-1531, 2005.

MUSSER, G. G.; M. D. CARLETON. Family Muridae. Pp. 501–755 in *Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference* (D. E. Wilson and D. M. Reeder, eds). **Smithsonian Institution Press**, Washington, D.C, 1993.

MYERS, P. "**Rodentia**" (**On-line**), Animal Diversity Web. Acessado em 06 de Agosto de 2014. <http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Rodentia/>. 2000.

NEI, M. *Molecular Evolutionary Genetics*. **Columbia University Press**, New York, NY, USA. 1987.

NEI, M.; JIN, L. Variances of the average numbers of nucleotide substitutions within and between populations. **Molecular Biology and Evolution**. 6(3): 290–300. 1989.

NEI, M.; LI, W. H. **Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases**. National Academy of Sciences of the United States of America Proceedings, Washington, v. 76, p. 5269-5273, 1979.

NOWAK, R. M. Walker's Mammals of the World. Book: **The Johns Hopkins University press**. Vol. I: 1836. Baltimore and London, 1999.

NYLANDER, J. A. A. Bayesian phylogenetics and the evolution of gall wasps. (MrModeltest v2). **Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology**, ISSN 1104-232X; 937. 2004.

OLIVEIRA, J. A. Morphometric assessment of species groups in the South American rodent genus *Oxymycterus* (Sigmodontinae), with taxonomic notes base on the analysis of type material. **Tese de doutorado**, Texas Tech University, 320 p, 1998.

OLIVEIRA, J.A.; BONVICINO, C.R. Ordem Rodentia. In N.R. Reis, A.L. Peracchi, W.A. Pedro, & I.P. Lima (eds.). Mamíferos do Brasil. **Imprensa da UEL**, Londrina, p. 347-406. 2006.

OLIVEIRA, J.A.; SILVEIRA, G.; ROCHA, V.J.; SILVA, C.E.F. Ordem Rodentia. In: REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; MARÍÑO, H.F.; ROCHA, V.J. (orgs). Mamíferos da Fazenda Monte Alegre - Paraná. Londrina. **Eduel: Editora da Universidade Estadual de Londrina**, p.161-191, 2005.

PALMA, R. E.; BORIC-BARGETTO, D.; TORRES-PÉREZ, F.; HERNÁNDEZ, C. E.; YATES, T. L. Glaciation Effects on the Phylogeographic Structure of *Oligoryzomys longicaudatus* (Rodentia: Sigmodontinae) in the Southern Andes. **PLoS ONE**. 7(3): 10. 2012.

PARADA, A.; PARDIÑAS, U. F. J.; et al. Dating na impressive Neotropical radiation: Molecular time estimates for the Sigmodontinae (Rodentia) provide insights into its historical biogeography. **Molecular Phylogenetics and Evolution**. 66. 960-968. 2013.

PARDIÑAS, U. F. J.; D'ELÍA, G.; CIRIGNOLI, S.; SUAREZ, P. A new species of *Akodon* (Rodentia, Cricetidae) from the Northern Campos grasslands of Argentina. **Journal of Mammalogy** 86(3):462–474. 2005.

PARDIÑAS, U. F.J.; D'ELIA, G.; ORTIZ, P. E. Sigmodontinos fósiles (rodentia, muroidea, sigmodontinae) de América del sur: estado actual de su conocimiento y prospectiva. **Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.**; 9(2):209-252, 2002.

PATTERSON, B. e PASCUAL, R. The fossil mammal fauna of South America, p. 247-309. In: A. KEAST; F.C. ERK & B. GLASS (Eds). Evolution, mammals and southern continents. Albany, **State University New York Press**, 543p. 1972.

PICOT, H. *Holochilus brasiliensis* and *Nectomys squamipes* (Rodentia: Cricetidae) natural hosts of *Schistosoma mansoni*. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz** 87: 225-260,1992.

PILLAR, V. D.; (Org.); MÜLLER, S. C.; (Org.); CASTILHOS, Z. M. S; (Org.); JACQUES, A. V. A. (Org.). **Campos Sulinos: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade**. 1. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, v. 1. 403p. 2009.

PINCELLI, M. P.; BARBAS, C.S.V.; CARVALHO, C. R. R, OLIVEIRA Jr, A. D.; SOUZA, L. T. M.; FIGUEIREDO, L. T. M. Síndrome pulmonar e cardiovascular por hantavírus. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**. 29(5). 2003.

REIG, O. A. A new fossil genus of South American cricetid rodents allied to *Wiedomys*, with an assessment of the Sigmodontinae. **Journal of Zoology** 192:257-281. 1980.

REIG, O. A. An assessment of the systematics and evolution of the Akodontini, with description of new fossil species of *Akodon* (Cricetidae, Sigmodontinae) In: **Studies in Neotropical Mammalogy**. Essays in Honor of Philip Hershkovitz. Chicago: Fieldiana Zoology; pp. 347–399, 1987.

REIG, O. A. Distribuição geográfica e história evolutivas dos roedores Muroideos sulamericanos (Cricetidae: Sigmodontinae). **Revista Brasileira de Genética** 7(2):333-365. 1984.

REIG, O. A. Diversidad, historia evolutiva y dispersión de los roedores cricétidos sudamericanos. **Acta Científica Venezolana**. 26 (Supl. 1):7. 1975.

REIG, O. A. **Teoría del origen y desarrollo de la fauna de mamíferos de América del Sur**. Monographiae Naturae Museo Municipal Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia 1:1-161. 1981.

RODRIGUEZ-SERRANO, E.; CANCINO, R. A.; PALMA, R. E. Molecular phylogeography of *Abrothrix olivaceus* (rodentia: sigmodontinae) in Chile. **Journal of Mammalogy**, 87(5):971-980, 2006.

ROISENBERG, A.; VIERO, A. P. O vulcanismo mesozóico da Bacia do Paraná no Rio Grande do Sul. In: Holz & De Ros (2000). **Geologia do Rio Grande do Sul**. CIGO/UFRGS Porto Alegre, 444p. 2000.

ROZAS, J.; LIBRADO, P.; SÁNCHEZ-DEL BARRIO, J. C.; MESSEGUER, X.; ROZAS, R. **DnaSP Version 5 Help Contents** [Help File]. Available with the program at <http://www.ub.edu/dnasp/>. 2010.

SARASTE, M. Oxidative Phosphorylation at the fin de siècle. **Science**. 283(5407):1488-1493. 1999.

SAVAGE, J.M. **The isthmian link and the evolution of Neotropical mammals**. Contributions in Science of the Natural History Museum of Los Angeles County, Los Angeles, 260: 1-51, 1974.



SBALQUEIRO, I. J. Análises cromossômicas e filogenéticas em algumas espécies de roedores da Região Sul. Porto Alegre, **Tese de Doutorado**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1989.

SBALQUEIRO, I.J., MATTEVI, M.S., OLIVEIRA, L.F.B. An X1X1X2X2/X1X2Y mechanism of sex determination in a South American rodent, *Deltamys kemp* (Rodentia, Cricetidae). **Cytogenetic and Genome Research**, Vol. 38, No. 1, 1984.

SILVA, M. J. J.; YONENAGA-YASSUDA, Y. Karyotype and chromosomal polymorphism of an undescribed Akodon from Central Brazil, a species with the lowest diploid chromosome number in rodents. **Cytogenetics and Cell Genetics**. 81:46-50. 1998.

SIMPSON, G. G. **History of the fauna of Latin America**. Am. Sci. 38:361–389. 1950.

SMITH, M. F. e PATTON, J. L. Phylogenetic relationships and the radiation of sigmodontine rodents in South America: evidence from cytochrome b. J. Journal of **Mammalian Evolution**. 6: 89–128. 1999.

SMITH, M. F.; PATTON, J. L. The diversification of South American murid rodents: evidence from mitochondrial DNA sequence data for the akodontine tribe. **Biological Journal of the Linnean Society** 50:149-177. 1993.

SOUZA, A. C. B. de. Filogeografia em lagartos (reptilia: squamata) no baixo tocamantins, ilha do marajó e sul do amapá, brasil. Belém. **Tese de doutorado**. Departamento de Zoologia. Universidade Federal do Pará, 2008.

SVARTMAN, M.; ALMEIDA, E. J. C. de. The karyotype of *Oxymycterus* sp (Cricetidae, Rodentia) from Central Brazil. **Journal Experientia**. Volume 49, Issue 8 pp 718-720, 1993.

TAJIMA, F. "Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism". **Genetics** 123 (3): 585–95. 1989.

TAMURA, K.; PETERSON, D.; PETERSON, N.; STECHER, G.; NEI, M.; KUMAR, S. MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. **Molecular Biology and Evolution**. 28:2731–2739, 2011.

TOMAZELLI, L.J.; VILLWOCK, J. A. O Cenozóico no Rio Grande do Sul: Geologia da Planície Costeira. In: HOLZ, M. & DE ROS, L. F (Ed.). **Geologia do Rio Grande do Sul** IG/UFRGS, 375-406. 2000.

VALDEZ, L.; D'ELÍA, G. Differentiation in the Atlantic Forest: phylogeography of *Akodon montensis* (Rodentia, Sigmodontinae) and the Carnaval–Moritz model of Pleistocene refugia. **Journal of Mammalogy**, 94(4):911–922, 2013.

VAN DER HAMMEN, H. The Quaternary climatic changes of northern South America. **Annals of the New York Academy of Sciences**. 95:676–683. 1961.

- VAUGHAN, T. A. **Mammalogy**. 2. ed. Philadelphia, Saunders Company, 522p. 1978.
- VAUGHAN, T.V., RYAN, J. M. e CZAPLEWSKI, N. J. **Mammalogy**. 4th edition, Brooks Cole, 2000.
- VAZ FERREIRA, R. Nota sobre Cricetinae del Uruguay. **Archivos de la Sociedad Biológica** 24:66–75, 1960.
- VENTURA, K.; SATO-KUWABARA, Y.; FAGUNDES, V.; GEISE, L.; LEITE, Y. L.; COSTA, L. P.; SILVA, M. J.; YONENAGA-YASSUDA, Y.; RODRIGUES, M. T. Phylogeographic structure and karyotypic diversity of the Brazilian shrew mouse (*Blarinomys breviceps*, Sigmodontinae) in the Atlantic Forest. **Cytogenetic and Genome Research**. 138(1):19–30. 2012.
- VENTURA, K.; SILVA M. J. J.; GEISE, L.; LEITE, Y. L. R.; PARDIÑAS, U. F. J; YONENAGA-YASSUDA, Y.; D'ELIA, G. The phylogenetic position of the enigmatic Atlantic forest-endemic spiny mouse *Abrawayomys* (Rodentia: Sigmodontinae). **Zoological Studies**, 52:55. 2013.
- VIEIRA, E.F. **Rio Grande do Sul: geografia física e vegetação**. Sagra, Porto Alegre. 1984.
- VITTULO, A. D., et al. Cytogenetics of South American akodont rodents (Cricetidae): new karyotypes and chromosomal banding patterns of Argentinian and Uruguayan forms. **Journal of Mammalogy**. 67:69–80, 1986.
- WEKSLER, M. Phylogeny of Neotropical oryzomyine rodents (Muridae: Sigmodontinae) based on the nuclear IRBP exon. **Molecular Phylogenetics and Evolution** 29, 331–349, 2003.
- WEKSLER, M. Phylogenetic relationships of oryzomine rodents (Muroidea: Sigmodontinae): separate and combined analyses of morphological and molecular data. **Bulletin of the American Museum of Natural History**. 296:1-149. 2006. (A)
- WEKSLER, M.; PERCEQUILLO, A. R.; VOSS, R.S. Ten new genera of oryzomyine rodents (Cricetidae: Sigmodontinae). **American Museum Novitates** 3537:1-29, 2006.(B)
- WEKSLER, M.; BONVICINO, C. R. Taxonomy of pygmy rice rats genus *Oligoryzomys* Bangs, 1900 (Rodentia, Sigmodontinae) of the Brazilian Cerrado, with the description of two new species. **Arquivos do Museu Nacional**, Rio de Janeiro 63 (1), 113-130, 2005.
- WEKSLER, M.; GEISE, L.; CERQUEIRA, R. A new species of *Oryzomys* (Rodentia, Sigmodontinae) from southeast Brazil, with comments on the classification of the *O. capito* species group. **Zoological Journal of the Linnean Society** 125:445–462, 1999.

WHITAKER, J.O.; WALTERS, B.L.; CASTOR, L.K.; RITZI, C.M.; WILSON, N. Host and distribution lists of mites (Acari), parasitic and phoretic, in the hair or on the skin of North American wild mammals north of Mexico: records since 1974. **Faculty Publications from the Harold W. Manter Laboratory of Parasitology**, University of Nebraska, Lincoln 1:1–173. 2007.

WILSON, D. E.; REEDER, D. M. *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*, 3<sup>a</sup> Ed, Volume 12. Front Cover. JHU Press, Nov 16, 2005.  
WRIGHT, S. Isolation by distance. **Genetics** 28:114–138, 1943.

WU, C.-I.; LI, W.-H. Evidence for higher rates of nucleotide substitution in rodents than in man. **Proceedings of the National Academy of Sciences**. USA 82: 174 I-I 745, 1985.

XIMÉNEZ, I.; LANGGUTH, A.; PRADERI, R. Lista sistemática de los mamíferos del Uruguay. **Anales del Museo de Historia Natural**. 2a serie, vol. VII(5): 29-35. Montevideo, Uruguay. 1972.

## 10 ANEXOS

### 10.1 TABELA DESCRITIVA DE AMOSTRAGEM

A Tabela apresenta todos os exemplares de *Oxymycterus*, utilizados no recorrente trabalho. Na mesma, discrimina-se a instituição em que está depositado, o número de identificação da amostra, a localidade de coleta, os Estado em que foi amostrada e as coordenadas geográficas amostrais (latitude e Longitude).

Depósito	Referência	Localidade/Município	Estado	Latitude	Longitude
FURB	449	Anitápolis	SC	-27,901944	-49,128889
FURB	510	Anitápolis	SC	-27,901944	-49,128889
FURB	511	Anitápolis	SC	-27,901944	-49,128889
FURB	621	Blumenau	SC	-26,908889	-49,072222
FURB	901	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	999	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	5005	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	5014	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	5047	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5074	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5092	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5234	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5936	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	6249	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
FURB	6250	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
FURB	6502	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	9090	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9124	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9170	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9193	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9215	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9220	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9224	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9240	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9333	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9365	Água Doce	SC	-26,997778	-51,555833
FURB	9653	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9679	Blumenau	SC	-26,908889	-49,072222
FURB	9682	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9768	Gaspar	SC	-26,930833	-48,958889
FURB	9808	Gaspar	SC	-26,930833	-48,958889
FURB	9825	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9856	Água Doce	SC	-26,997778	-51,555833
FURB	9983	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	12004	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	12094	Luiz Alves	SC	-26,720833	-48,932778
FURB	12276	Faxinal dos Guedes	SC	-26,852778	-52,261001
FURB	12615	Ibirama	SC	-27,056944	-49,517778
FURB	12654	Ibirama	SC	-27,056944	-49,517778
FURB	15106	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15135	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15140	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15145	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833

FURB	15154	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15160	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15171	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15788	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	18041	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	18119	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	18153	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	18228	Candói	PR	-25,570833	-52,052778
FURB	18598	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	18669	Itapoá	SC	-26,116944	-48,6158
FURB	18723	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	20078	São José do Cerrito	SC	-27,662778	-50,581001
FURB	20520	Abdon Batista	SC	-27,610833	-51,022778
FURB	20526	Abdon Batista	SC	-27,610833	-51,022778
UFPR	P42	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P44	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P50	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P53	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P54	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P56	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P59	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P60	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P62	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P65	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P76	Ponta Grossa/Vila Velha	PR	-25,095	-50,161944
UFPR	P86	Curitiba/Mata da Varzea	PR	-25,429722	-49,271944
UFPR	P87	Curitiba/Mata da Varzea	PR	-25,429722	-49,271944
UFPR	P119	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P124	São Mateus do Sul	PR	-25,873889	-50,382778
UFPR	P177	Morretes/Marumbi¹	PR	-25,346916	-48,76826
UFPR	P371	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P372	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P373	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P374	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P375	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P376	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P377	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P403	S. J. dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P495	Jaguariaíva	PR	-24,250833	-49,705833
UFPR	P752	Guaraqueçaba/Índios	PR	-25,306944	-48,3288
UFPR	P754	Guaraqueçaba/Índios	PR	-25,306944	-48,3288
UFPR	P757	Guaraqueçaba/Massarapuã	PR	-25,345051	-48,434984
UFPR	P760	Guaraqueçaba/Índios	PR	-25,306944	-48,3288
UFPR	P969	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P970	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P973	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P980	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P995	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1008	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1018	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1019	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1039	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1049	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1051	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1053	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1055	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1061	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373

UFPR	P1099	S. J. dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFRGS	ALV 16	APA Lagoa Verde- Rio Grande	RS	-32,139934	-52,181064
UFRGS	HL 11	Herval	RS	-32,023889	-53,395833
UFRGS	CAM 09	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 12	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 13	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 15	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 21	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 34	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 01	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 02	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 05	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 07	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 08	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 10	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 30	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 43	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 44	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 47	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 63	Cristal	RS	-31,002778	-52,05
UFRGS	FQ 72	Cristal	RS	-31,002778	-52,05
UFRGS	GUA 04	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 05	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 06	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 07	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 12	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 13	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 17	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 18	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 19	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 20	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 21	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 22	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	HFE 01	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 02	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 03	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 04	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 05	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	MEV 01	Mata Estrada Velha-Rio Grande	RS	-32,035	-52,098889
UFRGS	MEV 02	Mata Estrada Velha-Rio Grande	RS	-32,035	-52,098889
UFRGS	PL 17	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 44	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 200	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 201	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 300	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	POS 18	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 20	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 25	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 27	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	PRM 13	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	AS 17	Cambará do Sul <sup>2</sup>	RS	-29,191667	-50,0975
UFRGS	AS 05	Cambará do Sul <sup>2</sup>	RS	-29,191667	-50,0975
UFRGS	PET 30	Cambará do Sul <sup>3</sup>	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PET 31	Cambará do Sul <sup>3</sup>	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PET 35	Cambará do Sul <sup>3</sup>	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PET 44	Cambará do Sul <sup>3</sup>	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PRM 129	Pró-Mata/São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487

UFRGS	PRM 105	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	RIB 20	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	SLS 07	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 08	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 13	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 14	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 17	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	PM 47	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 65	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 66	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 70	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 74	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 76	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 79	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 80	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 86	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 87	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 91	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 99	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 100	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 104	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	TAI 40	ESEC Taim- Rio Grande	RS	-32,7425	-52,574444
UFRGS	TAP 03	Tapes	RS	-30,72778	-51,395833
UFRGS	FQ 105	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325

Legenda:

**UFPR** – Universidade Federal do Paraná

**FURB** – Universidade de Blumenau

**UFRGS** – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

<sup>1</sup> Bacia do Rio do Nunes

<sup>2</sup> Parque Nacional dos Aparados da Serra

<sup>3</sup> Parque Estadual de Tainhas

## 10.2 ARTIGO CIENTÍFICO I

**Título:** “INFERÊNCIA FILOGENÉTICA NO GÊNERO *Oxymycterus* (CRICETIDAE: SIGMODONTINAE) NO SUL DO BRASIL: REVISÃO DE OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES ATRAVÉS DE SEQUÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL”.

**Revista:** *Journal of Mammalogy*.



# INFERÊNCIA FILOGENÉTICA NO GÊNERO *Oxymycterus* (CRICETIDAE: SIGMODONTINAE) NO SUL DO BRASIL: REVISÃO DE OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES ATRAVÉS DE SEQUÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL.

Willian Thomaz Peçanha<sup>1</sup>; Gislene Lopes Gonçalves<sup>2</sup>; Fernando Marques Quintela<sup>3</sup>; Sérgio Luiz Althoff<sup>4</sup>; Iris Hass<sup>1</sup>; Thales Renato O. de Freitas<sup>1,2,3</sup>

1. Programa de Pós-Graduação em Genética – UFPR.
2. Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular - UFRGS
3. Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal – UFRGS
4. Departamento de Biologia – FURB

**RESUMO:** O gênero *Oxymycterus* (Waterhouse, 1837) é um roedor Sulamericano, da subfamília Sigmodontinae, que possui uma controversa sistemática, principalmente à sua semelhança morfológica e citogenética. Os limites genéticos deste gênero, assim como suas potenciais espécies reais são alvo de inúmeras incertezas taxonômicas, com poucos trabalhos indicando a relação entre grupos-irmãos, tendo como suporte medidas morfológicas e, mais recentemente, delimitação de diferenças genéticas. Nas revisões mais recentes, são descritas quatro espécies para o sul do Brasil: *O. nasutus*, *O. quaestor*, *O. judex* e *O. delator*. Para investigar a ocorrência destas espécies nesta região utilizamos 743 pb de sequências do gene mitocondrial citocromo *b* em 181 espécimes provenientes de 42 localidades, incluindo sequências como referência do GenBank. A filogenia bayesiana inferida revelou apenas duas espécies propostas para o Brasil Meridional: *O. nasutus* e *O. quaestor*. O *O. dasytrichus*, não antes descrito como ocorrente a região sul, é evidenciado com suporte filogenético. Uma amostra (P495), coletada numa porção de Cerrado do Paraná, aparece como conflitante com sequências depositadas, sendo potencialmente uma espécie nova de *Oxymycterus* para o Sul do Brasil. As relações filogenéticas entre espécies foram concordantes com aquelas propostas na literatura utilizando sequências do banco de dados.

Palavras-Chave: Citocromo b, Akodontini, Rodentia

Correio eletrônico do autor: [wthomaz90@gmail.com](mailto:wthomaz90@gmail.com)

Periódico a ser submetido: *Journal of Mammalogy*.

De ocorrência na América do Sul, com 82 gêneros existentes e aproximadamente 400 espécies, a subfamília Sigmodontinae é um dos mais diversos e complexos grupos de mamíferos Neotropicais (PARADA *et al.* 2013). Esta subfamília está representada por nove tribos: Oryzomyini (a maior), Akodontini, Sigmodontini, Ichthyomyini, Thomasomyini, Wiedomyini, Phyllotini, Reithrodontini e Abrotrichini (D'ELIA *et al.*, 2007). A tribo

Akodontini é a segunda maior tribo da subfamília Sigmodontinae, possuindo 35% da diversidade de espécies de roedores da América do sul, embora as relações de gêneros e espécies dentro desta tribo sejam imprecisas (SMITH e PATTON, 1993; MUSSER e CARLETON, 2005), e inclui-se nesse contexto o gênero *Oxymycterus* (Waterhouse, 1837). A característica mais evidente deste táxon são suas garras bem desenvolvidas e focinho longo, cauda geralmente pouco pilosa e com as escamas aparentes, pêlos ungueais (próximo às patas) escuros e escassos (BONVICINO, 2008). O gênero ainda caracteriza-se por possuir uma dieta insetívora e com caracteres morfológicos adaptados ao ambiente terrestre e semi-fossorial. Podem adotar hábitos de predação competindo por vermes com marsupiais, como os gêneros *Philander* e *Metachirus* (CARLETON, 1973; HERSHKOVITZ, 1994; BONVICINO, 2008). Algumas espécies podem servir de reservatórios significativos de hantavírus entre outras doenças (OLIVEIRA *et al.*, 2005). Estes roedores ocupam uma diversificada e ampla distribuição geográfica, com registros que vão desde o centro da Argentina (província de Buenos Aires), ao Sul ao Uruguai, à bacia do Amazonas, incluindo grupos de ocupação na região andina Peruana e Boliviana a mais de 4000 m de altitude (HERSHKOVITZ, 1994). O gênero *Oxymycterus* possui 16 espécies (MUSSER e CARLETON 2005) que são bastante semelhantes em sua aparência externa, além de apresentar na maioria, o mesmo padrão citogenético ( $2n = 54$  e  $FN_A = 64$ ), com escassas alterações (SBALQUEIRO, 1989; SVARTAMAN e ALMEIDA, 1993), que acarretou em uma confusa sistemática histórica (HERSHKOVITZ 1994; REIG 1987). Entretanto, na última revisão de Musser e Carleton (2005) não são consideradas espécies descritas *a posteriori*, além de relatar possíveis espécies válidas como sinônimas. O gênero possui nove espécies ocorrentes no Brasil, com algumas espécies que habitam exclusivamente o bioma Mata Atlântica, enquanto outros ocupam o Cerrado, área periférica da Floresta Amazônica, Pampas e Caatinga, restrito às regiões mais férteis, frequentemente nas chapadas e bases de serras. A monofilia do gênero tem sido estudada e estabelecida por investigações através de marcadores moleculares (SMITH e PATTON, 1993; HOFFMAN *et al.*, 2002; JAYAT *et al.*, 2008). No entanto, controvérsias sobre as relações hierárquicas entre as espécies de *Oxymycterus* ainda persistem.

Nosso estudo tem como foco lançar mais inferências, contribuindo sobre o conhecimento dos padrões através dos quais *Oxymycterus* é disperso e diversificado nos diferentes biomas presentes no Sul do Brasil, reavaliando os táxons propostos pela

literatura. Esta pesquisa foi realizada usando sequências de 181 indivíduos de *Oxymycterus* para o gene mitocondrial citocromo b (cyt b), do gênero *Oxymycterus*, coletados em 42 localidades do sul do Brasil, cobrindo uma grande área que inclui os Biomas da Mata Atlântica e Pampa, além de uma pequena porção do Cerrado. Estas sequências de citocromo b foram postas em comparação com as sequências do GenBank de espécies endêmicas de outros locais do Brasil e da América do Sul, utilizadas como referência, totalizando 230 sequências analisadas.




Figura 1. Distribuição geográfica do sul do Brasil dos *Oxymycterus* amostrados neste estudo. Pontos indicam a localidade de amostragem. Localidades dos pontos de referência enumerados estão em Tabela 1.

## Materiais e Métodos

**Amostragem** - A cobertura geográfica da amostragem abrange amostras de 181 espécimes de *Oxymycterus* coletados em 42 localidades da região sul do Brasil (Figura 1), provenientes das coleções do Laboratório de Citogenética e Evolução da UFRGS, do

Laboratório de Biologia da FURB e do Laboratório de Citogenética e Conservação Animal da UFPR (Anexo I, Tab. 3). As sequências referência foram obtidas do Genbank das sequências (parciais) disponíveis do gene mitocondrial citocromo *b* (cyt *b*), de 12 espécies do gênero *Oxymycterus* (Anexo II, Tab. 4) e da espécie *Juscelinomys huanchacae* (acesso: JQ898084) utilizada como grupo externo, para a análise de Inferência Bayesiana.

*Procedimentos de Laboratório* - O DNA foi extraído a partir de rim, fígado, coração ou músculo (armazenados a -20° C ou em etanol a 70%) utilizando o kit de extração PureLink® Genomic DNA (Invitrogen, Life Technologies), seguindo instruções do fabricante. As sequências do gene mitocondrial citocromo *b* foram obtidas por reação em cadeia da polimerase utilizando os iniciadores MVZ 05 e MVZ 16 (SMITH e PATTON, 1993), com as seguintes condições: 94°C durante 3 min; 35 ciclos de 94°C por 20s, 45°C por 15s, 72°C para 60s, e 72°C por 7 min. Todas as reações incluíram um controle negativo. Os produtos de PCR foram purificados com exonuclease I e fosfatase alcalina (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ) e, sequenciados pela empresa Macrogen, Inc. (Seul, Coreia do Sul).

*Análise de Dados* - Para a edição e alinhamento das sequências utilizou-se o programa MEGA v6 (TAMURA *et al.*, 2011). As sequências geradas serão depositadas nas bases de dados Genbank. Análises de distância evolutivas foram calculadas utilizando os critérios de Kimura 2-parâmetros (KIMURA, 1980) através do software MEGA v6. Medidas padrão de variabilidade genética, como número de sítio variáveis (S), diversidade haplotípica (Hd) (NEI, 1987) e nucleotídica ( $\pi$ ) (NEI e JIN, 1989) foram feitas através do programa DnaSP v5 (ROZAS *et al.*, 2010). A filogenia foi reconstruída utilizando-se inferência bayesiana através do programa BEAST v2 (BOUCKAERT *et al.*, 2014) utilizando 743 pares de base (pb) de sequências do gene mitocondrial citocromo *b* em dois níveis taxonômicos: (i) entre as 12 espécies de *Oxymycterus* (interespecífica) e (ii) entre os 181 espécimes de *Oxymycterus* amostrados (intraespecífica). O modelo de substituição nucleotídica foi estimado utilizando o programa MrModeltest v2.3 (NYLANDER, 2004), seguindo o critério de informação de Akaike. Duas corridas independentes de cadeias de Markov e Montecarlo (MCMC) foram realizadas com 250 e

25 milhões de gerações, para as abordagens inter e intraespecífica, respectivamente, e a amostragem das árvores foi feita a cada 25000 e 2500 gerações. O tamanho efetivo dos parâmetros de amostragem das cadeias de MCMC (> 200 ESS) foi verificado usando o software Tracer v1.5 (<http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/>). Duas corridas independentes foram sumarizadas no software TreeAnnotator v1.6.2 (DRUMMOND e RAMBAUT, 2007), onde as primeiras árvores (~10%) foram descartadas e o restante usado para inferir uma árvore *a posteriori*, visualizada no programa Figtree v1.3.1 (<http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/>).

**Tabela 1.** Referência de localidade da amostragem da Figura 1.

Ponto	Bioma	Estado	Localidade	N	Latitude	Longitude
1	Mata Atlântica	PR	Guaraqueçaba/Índios	3	-25,306944	-48,3288
2	Mata Atlântica	PR	Guaraqueçaba/Massarapuã	1	-25,345051	-48,434984
3	Mata Atlântica	PR	Marumbi/Bacia do Rio do Nunes	1	-25,3469159	-48,76826
4	Mata Atlântica	PR	Jaguariaíva/Faz. Cha. do Sto Antônio	1	-24,250833	-49,705833
5	Mata Atlântica	PR	Ponta Grossa/Vila Velha	1	-25,095	-50,161944
6	Mata Atlântica	PR	São Mateus do Sul/Fazenda Durgo	1	-25,873889	-50,382778
7	Mata Atlântica	PR	Curitiba- Mata da Varzea	2	-25,429722	-49,271944
8	Mata Atlântica	PR	Piraquara	10	-25,441944	-49,062778
9	Mata Atlântica	PR	São José dos Pinhais/Guaricana	9	-25,717171	-49,135068
10	Mata Atlântica	PR	São José dos Pinhais/Barro Preto	15	-25,5799	-49,175373
11	Mata Atlântica	PR	Candói	1	-25,570833	-52,052778
12	Mata Atlântica	SC	Itapoá	1	-26,116944	-48,6158
13	Mata Atlântica	SC	Luiz Alves	1	-26,720833	-48,932778
14	Mata Atlântica	SC	Gaspar	2	-26,930833	-48,958889
15	Mata Atlântica	SC	Indaial	13	-26,897778	-49,231944
16	Mata Atlântica	SC	Blumenau	2	-26,908889	-49,072222
17	Mata Atlântica	SC	Dr. Pedrinho	4	-26,713889	-49,482778
18	Mata Atlântica	SC	Ibirama	2	-27,056944	-49,517778
19	Mata Atlântica	SC	Anitápolis	3	-27,901944	-49,128889
20	Mata Atlântica	SC	São José do Cerrito	1	-27,662778	-50,581001
21	Mata Atlântica	SC	Campo Belo do Sul	7	-27,898889	-50,760833
22	Mata Atlântica	SC	Abdon Batista	2	-27,610833	-51,022778
23	Mata Atlântica	SC	Água Doce	2	-26,997778	-51,555833
24	Mata Atlântica	SC	Faxinal dos Guedes	1	-26,852778	-52,261001
25	Mata Atlântica	SC	São Domingos	6	-26,557778	-52,531944
26	Mata Atlântica	SC	Itá	7	-27,290833	-52,322778
27	Mata Atlântica	RS	Erechim	5	-27,633889	-52,273889
28	Mata Atlântica	RS	Cambará do Sul <sup>1</sup>	2	-29,191667	-50,0975
29	Mata Atlântica	RS	Cambará do Sul <sup>2</sup>	4	-29,084606	-50,366
30	Mata Atlântica	RS	Pró-Mata /São Francisco de Paula	17	-29,550768	-50,276487

31	Pampa	RS	Guaíba	13	-30,113889	-51,325
32	Pampa	RS	Barra do Ribeiro	7	-30,290833	-51,300833
33	Pampa	RS	Tapes	1	-30,72778	-51,395833
34	Pampa	RS	Camaquã	12	-30,850833	-51,811944
35	Pampa	RS	Cristal	2	-31,002778	-52,05
36	Pampa	RS	São Lourenço do Sul	5	-31,365	-51,977778
37	Pampa	RS	HBITL-Pelotas	5	-31,771944	-52,342778
38	Pampa	RS	Pedro Osório-Ar. Moreira	4	-31,863889	-52,822778
39	Pampa	RS	Herval	1	-32,023889	-53,395833
40	Pampa	RS	Mata Estrada Velha-Rio Grande	2	-32,035	-52,098889
41	Pampa	RS	APA Lagoa Verde- Rio Grande	1	-32,139934	-52,181064
42	Pampa	RS	ESEC Taim- Rio Grande	1	-32,7425	-52,574444

<sup>1</sup>Parque Nacional dos Aparados da Serra.

<sup>2</sup>Parque Estadual de Tainhas.

## Resultados

Para a construção de filogenias foram utilizados 743 pb do gene *cyt b*, de 181 espécimes do gênero *Oxymycterus* sp. amostrados e 49 sequências obtidas no Genbank (Anexo II – Tab. 4), representando 12 espécies do gênero *Oxymycterus*, além do akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* (Acesso: JQ898084), de forma a enraizar a árvore na Inferência Bayesiana. As 230 sequências analisadas, apresentaram 268 sítios variáveis (36%), sendo os índices das frequências nucleotídicas do *cyt b*: T, 28,8%; C, 30,2%; A, 27,8% e G, 13,2%.

A distância genética média entre as espécies de *Oxymycterus* foi de 5,79%. A menor distância observada foi 0,2% (entre *O. misionalis* e *O. judex*) e a maior de 10,79% entre o *O. paramensis* e o clado *Oxymycterus* aff. *quaestor* (Tabela 2).


**Tabela 2.** Média de distâncias genéticas observadas (K2P, expressa em %) entre os pares de haplótipos de *cyt b* de diferentes espécies de *Oxymycterus*.

Taxa	<i>J. huanchacae</i>	<i>quaestor</i>	aff. " <i>quaestor</i> "	<i>misionalis</i>	<i>judex</i>	<i>nasutus</i>	<i>dasytrichus</i>	<i>josei</i>	<i>rufus</i>	<i>hiska</i>	<i>paramensis</i>	<i>wayku</i>	<i>amazonicus</i>	<i>delator</i>
<i>J. huanchacae</i>														
<i>quaestor</i>	13,37													
aff. " <i>quaestor</i> "	13,65	4,16												
<i>misionalis</i>	11,76	1,69	4,15											
<i>judex</i>	11,51	1,48	3,95	0,20										
<i>nasutus</i>	11,37	6,75	8,16	4,91	5,12									
<i>dasytrichus</i>	12,99	7,76	9,08	5,87	6,10	4,94								
<i>josei</i>	10,48	5,71	7,33	4,33	4,11	5,70	5,79							
<i>rufus</i>	11,19	5,89	7,46	5,31	5,09	6,33	6,40	1,88						
<i>hiska</i>	11,11	8,46	9,73	6,54	6,77	5,80	6,22	8,11	8,74					
<i>paramensis</i>	10,12	9,88	10,79	7,91	8,14	8,32	8,72	8,11	9,39	6,82				
<i>wayku</i>	11,11	7,53	8,83	5,65	5,87	4,44	4,30	5,41	6,25	5,91	5,91			
<i>amazonicus</i>	9,64	7,99	9,14	6,54	6,32	4,86	4,07	5,85	6,44	7,28	7,28	5,47		
<i>delator</i>	11,46	8,99	9,69	7,06	7,29	4,91	4,24	6,81	7,36	7,34	8,27	5,53	2,52	
<i>Oxymycterus</i> sp. (P495)	10,61	8,93	9,71	6,99	7,22	3,97	3,82	5,85	6,44	6,36	6,36	4,59	2,45	3,37

\*Espécies ocorrentes no Sul do Brasil em azul: *Oxymycterus* aff. "*quaestor*", *O. nasutus*, *O. dasytrichus* e *Oxymycterus*

sp. (P495) amostrados neste estudo, juntamente com as sequências obtidas do Genbank e/ou agrupadas com cada grupo taxonômico.

A árvore filogenética de consenso para 12 espécies do gênero *Oxymycterus* determina a monofilia do gênero com suporte nodal de probabilidade posterior bayesiana igual a 1 (PPB = 1) (Figura 2). O clado mais basal é formado por duas espécies, *O. hiska* e *O. paramensis*, com baixo suporte (PPB = 0,63). Excluindo o clado mais basal, *O. wayku* é evidenciada como a espécie mais externa com baixo suporte (PPB = 0,82). A árvore proposta apresenta uma relação pouco resolvida entre as espécies *O. judex* e *O. misionalis* (esta se apresentando como polifilética). Ainda, a amostra P495 apresenta uma relação imprecisa, proximamente relacionada às espécies *O. delator* e *O. amazonicus*, indicada aqui como *Oxymycterus* sp., ou seja, uma potencial espécie de nova ocorrência para a região Sul do Brasil. As sequências obtidas do Genbank correspondente as espécies *O. rufus* e *O. josei* formaram clados irmãos (PPB = 1), assim como o grupo *O. dasythricus* foi estreitamente relacionado com as espécies *O. delator* e *O. amazonicus* (BBP = 0,94). Os espécimes amostrados relacionados à linhagem de *O. nasutus* foram os mais abundantes, formando o maior grupo da árvore, com diversas estruturas internas. Dois grupos conspícuos foram verificados, um contendo espécimes predominantemente do Planalto Meridional, e outro espécimes da Planície Costeira. *Oxymycterus* aff. *quaestor* também apresenta padrão de estrutura interna, sendo as sequências referências utilizadas na árvore (obtidas do Genbank do *O. quaestor*) posicionadas externas as demais sequenciadas neste estudo, e em particular dois grupos foram evidentes, intitulados Clado 1 e Clado 2. Considerando apenas a amostragem deste estudo, os espécimes foram relacionados (agrupados) à cinco espécies já descritas: *O. quaestor*, *O. nasutus*, *O. dasythricus*, *O. delator* e *O. amazonicus*, sendo as quatro primeiras espécies de reconhecida ocorrência no sul e/ou sudeste do Brasil. Porém, somente os espécimes amostrados relacionados ao *O. quaestor* (discutidos como *Oxymycterus* aff. *quaestor*) obteve baixo valor de probabilidade posterior (PPB < 0,95). Todas as espécies e/ou grupos discutidos neste trabalho foram baseados exclusivamente nos agrupamentos gerados pela árvore consenso Bayesiana.





**Figura 2.** Árvore consenso Bayesiana reconstruída com base em sequências do gene mitocondrial citocromo *b* (743 pb), utilizando 181 espécimes de *Oxymycterus*, e 49 sequências do Genbank. O akodontíneo *Juscelinomys huanchacae* foi utilizado como grupo externo para enraizar a árvore. A probabilidade Bayesiana posterior (BPP) é indicada acima de cada ramo. Os asteriscos indicam BPP < 0.80.

## Discussão

A árvore filogenética obtida, com base no gene mitocondrial *cyt b* (Figura 2), recuperou agrupamentos já observados em trabalhos anteriores com o gênero (SMITH e PATTON, 1999; HOFFMAN *et al.*, 2002; JAYAT *et al.*, 2008). Entretanto, dados inéditos incorporados utilizando a mais ampla distribuição no sul do Brasil revelaram posições taxonômicas e potenciais táxons crípticos inesperados. Nas últimas revisões da literatura a região sul do Brasil (RS, SC e PR), apresentaria quatro espécies: *Oxymycterus delator*, *O. quaestor*, *O. judex* e *O. nasutus* (OLIVEIRA, 1998; BONCIVINO, 2008).

No entanto, na Figura 2, verificou-se a ocorrência predominante de dois táxons (*Oxymycterus* aff. *quaestor* e *O. nasutus*) e, considerando a amostragem deste estudo no sul do Brasil, e com base na inferência bayesiana, as espécies e/ou entidades biológicas deste gênero no sul do Brasil são: *Oxymycterus* aff. *quaestor*, *Oxymycterus nasutus*, *Oxymycterus dasytrichus* e *Oxymycterus* sp. (P495). A distância genética interespecífica média observada no gênero *Oxymycterus* foi de aproximadamente 6%, valor similar ao encontrado em mamíferos de forma geral (BRADLEY e BAKER, 2001).

Do total amostral, 59 haplótipos formaram um grupo denominado neste trabalho de *Oxymycterus* aff. *quaestor*, que, apresentou dois clados distintos que ocorrem de forma simpátrica ao longo do Planalto Meridional (Mata Atlântica), entretanto a inferência bayesiana não rejeita a hipótese que um destes clados pertençam a espécie *Oxymycterus quaestor* (Thomas, 1903), devido ao baixo suporte nodal evidenciado, e a outra (clado 1) seja representativa de uma espécie críptica (nova). Um aspecto a salientar é que os limites geográficos do *Oxymycterus quaestor* são confusos na literatura, havendo incompatibilidade de descrição de áreas de ocorrência, sendo alguns considerando apenas a ocorrência na área da localidade tipo (Roça Nova, Piraquara – PR) e outras descrições de ocorrência ao longo de todo o Planalto Meridional (OLIVEIRA e BONVICINO, 2006; MUSSER e CARLETON, 2005). Além disso, vários autores colocam em debate a existência sólida desta espécie, e atribuem uma condição sinônima com duas outras espécies, juntamente com *Oxymycterus judex* (Thomas, 1909) e *O. misionalis*

(Sanborn, 1931), que possuem uma distribuição, de acordo com a literatura, simpátrica ao *O. quaestor* (OLIVEIRA, 1998; JAYAT *et al.*, 2008). Gonçalves e Oliveira (2004) consideram que uma das implicações na taxonomia deste gênero é falta de disponibilidade de espécimes ‘tipo’ neste grupo, que possivelmente pode levar a interpretações confusas aos reais limites de divergência desta espécie. O *Oxymycterus* aff. *quaestor* apresenta uma distância genética de 4.16% em relação ao *O. quaestor*, 4.15% ao *O. misionalis* e 3.95% ao *O. judex* (Tabela 1). Autores como Avise (2000) e Bradley e Baker (2001), por exemplo, sugerem limites para distância genética. Avise (2000) relata que uma variação intraespecífica raramente ultrapassa 2%. Bradley e Baker (2001), em estudos utilizando o *cyt b*, em mamíferos de pequeno porte, relatam em suas conclusões, especificamente que os valores de divergência menores do que 2% indicariam variação intraespecífica, e que valores entre 2 e 11% teriam uma grande probabilidade de serem indicativos de populações coespecíficas ou de espécies válidas. Devido ao grupo em questão apresentar divergência 4% em relação a tais espécies, deve-se levar em consideração que a utilização de apenas dados moleculares pode não contemplar totalmente a questão delimitação de espécies. Apesar de dados moleculares serem bem informativos, quando combinados com outros tipos de parâmetros, como medidas morfológicas, características ecológicas e a análise das distribuições geográficas, torna-se mais eficazes (BICKFORD *et al.* 2007). Oliveira (1998), por exemplo, através de análises morfométricas, de alguns espécimes tipo depositas em coleções, determina que as espécies *Oxymycterus quaestor*, *O. judex* e *O. misionalis* formam um grupo denominado pelo autor como grupo “*judex*”, pela similaridade entre os parâmetros de suas respectivas medidas. Hoffmann *et al.* (2002) corroboram com Oliveira (1998), suportado com dados morfológicos e moleculares, que existe uma proximidade entre as três espécies supracitadas. Este autor em estudos moleculares utilizando *cyt b* encontra uma distância genética entre *O. judex* e *O. quaestor* de 2,8% e assim formam um clado com divergência inferior ao nível de divergência intraespecífica observado em outras espécies, como por exemplo *O. paramensis*, cujos dados de Jayat *et al.* (2008) apontam uma divergência intraespecífica de 4,4 à 6,4% (dependendo da linhagem), sendo sugerido por estes autores o status de espécie plena até que um novo argumento seja apresentado. Jayat *et al.* (2008) assim como Oliveira (1998), propõe que estas três espécies perfazem um único grupo, e também utilizando o mesmo marcador mitocondrial,

encontrou uma distância de 2,88% entre *O. quaestor* e *O. judex* / *O. misionalis*. Além disso, o autor ainda evidencia uma menor distância intraespecífica entre *O. judex* e *O. misionalis* (0,5%).

Outro problema taxonômico a salientar é a baixa divergência observada (0,2%) (Tabela 1) entre haplótipos atribuído a *O. judex* e *O. misionalis*. Estas duas espécies foram colocadas por Oliveira (1998), juntamente com o *O. quaestor*, no mesmo grupo de espécies com base na morfologia. Considerando as observações supracitadas sobre o uso de divergência genética para estabelecer limites de espécies, esse valor baixo é notável e levanta a necessidade de adicionais estudos de avaliação das fronteiras das espécies dentro do grupo de espécies “judex” propostos por Oliveira (1998). Portanto, uma análise criteriosa da morfologia, utilizando medidas craniométricas, por exemplo, combinada com a adição de sequências nucleares ao conjunto de dados poderia dar maior suporte a uma possível separação ou agrupamento do *Oxymycterus* aff. *quaestor* e *O. quaestor* e as duas outras espécies discutidos neste trabalho, e que neste caso podem estar sujeitas a um complexo de espécies crípticas e/ou sinônimas.

O *Oxymycterus nasutus* (Waterhouse, 1837) fora única espécie, onde os resultados baseados nos valores de Probabilidade Posterior Bayesiana (PPB = 1), foram concordantes como existentes de acordo com a literatura. 115 espécimes amostrados se alinharam em um único clado, e de acordo com Inferência Bayesiana, que utilizou quatro sequencias como referência desta espécie (Anexo II – Tab. 4), é colocada como pertencentes à espécie *Oxymycterus nasutus* (Figura 2). Estes espécimes formaram um clado, e devido ao suporte nodal mostrado na Figura 2 (PPB = 1), a coerência dos pontos amostrados com a literatura existente de ocorrência (do Pampa à Mata Atlântica) e demais análises para índices de diversidade genética, resultados de testes de neutralidade (não mostrados neste trabalho) e distância genética intraespecífica, fornece suporte a essa identificação molecular. Adicionalmente, as análises revelam uma distancia genética com base no cyt *b* intraespecífica de 1,34% entre as linhagens de Planalto Meridional e Planície Costeira.

Entretanto, apesar da distância genética intraespecífica ficar abaixo dos parâmetros propostos por Bradley e Baker (2001) e Avise (2000), ou seja, inferiores a 2%, a estimativa de diferenciação populacional a partir da variância das frequências alélicas

verificou um índice de fixação  $G_{ST}$  de 0,09, o que indica não haver estruturação populacional nesta espécie. Tal indicador pode ser observado na Figura 2, onde os haplótipos, de Planalto Meridional como os de Planície Costeira, se intercalam dentro do clado fornecido pela Inferência Bayesiana.

A espécie *Oxymycterus dasytrichus* (Fischer, 1814) de acordo com Bonvicino (2008), não é de ocorrência no sul do Brasil, porém, a amostragem deste estudo, e com base na inferência Bayesiana coloca seis sequências da amostragem como pertencentes a esta espécie (Figura 2), com um suporte nodal igual a 1 (BPP = 1). Conforme esta espécie possui uma distribuição ao longo de praticamente todo o Bioma da Mata Atlântica, no qual se inclui o litoral do estado do Paraná e Santa Catarina, estas seis sequências obtidas, oriundas das localidades de Marumbi/Bacia do Rio do Nunes, Guaraqueçaba/Indios, Guaraqueçaba/Massarapuã, no Paraná, e Itapoá em Santa Catarina (Figura 2). Hoffman *et al.* (2002) relata uma distância intraespecífica de 1,3% em *O. dasytrichus*. Considerando o suporte nodal da filogenia (PPB =1), e a distância genética intraespecífica de (0,96%), consideramos esta sequência como pertencente à espécie *Oxymycterus dasytrichus* Gonçalves e Oliveira (2004), em comparações entre espécimes amostrados na Bahia e no sudeste Brasileiro, retratam uma diferença intraespecífica entre 6,3-7,5% (cyt *b*). Os autores comentam que as populações do norte (Bahia) e do sul (sudeste) poderiam ter passado algum isolamento geográfico, ainda desconhecido, resultando em uma quantidade moderada de diferenciação genética entre eles. Entretanto, considerando apenas a distância genética intraespecífica de uma mesma população, encontraram valores entre 0,9-2,3%. Os autores propõem a existência de diferenciação ao longo do eixo norte-sul de distribuição, o que pode levar a diferentes níveis de distâncias genéticas.

Por fim, na análise bayesiana, a amostra P495 (colocada como *Oxymycterus* sp.) revela uma posição taxonômica confusa. Autores como Jayat *et al.* (2008) e Hoffman *et al.* (2002) revelaram em seus resultados *O. amazonicus* (Herskovitz, 1994) e *O. delator* (Thomas, 1903) como espécies-irmãs. De acordo com Bonvicino (2008) o *O. amazonicus* uma distribuição à região periférica da Floresta Amazônica. *O. delator* possui ocorrência no paran , e sua distribui  o se d  ao longo de todo o Cerrado. Conforme a Figura 2, a localidade em que fora amostrada este esp cime, pertence ao Bioma Cerrado, presente numa pequena por   o do estado do Paran  (m n cio de Jaguara va). A princ pio, estas

duas espécies relacionadas com a amostra P495, possuem uma distribuição simpátrica em algumas localidades de ocorrência. Porém, de acordo com a literatura, estas regiões de simpatria não condizem à região onde fora amostrada. Embora a amostra P495 possua um suporte nodal igual a 1, a filogenia proposta neste trabalho a coloca como “espécie irmã” do clado *O. delator* + *O. amazonicus*, sendo sua distância genética em relação ao *O. amazonicus* e *O. delator*, de 2.45% e 3.37% respectivamente. Entretanto vale ressaltar que se trata de apenas uma amostra, e que posteriores amostragens mais abrangentes são necessárias para elucidar a problemática deste clado.

AGRADECIMENTOS. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa concedida para atuação exclusiva neste trabalho.

#### ABSTRACT

The genus *Oxymycterus* (Waterhouse, 1837) is a South American rodent, the Sigmodontinae subfamily, which has a controversial systematic, primarily for their morphological and cytogenetic similarity. Genetic limits of this genus, as well as their potential real species are the subject of numerous taxonomic uncertainties, with few studies indicating the relationship between groups brothers, supported morphological measures and, more recently, delineation of genetic differences. In the most recent revisions are described four species to the south of Brazil: *O. nasutus*, *O. quaestor*, *O. judex* and *O. delator*. To investigate the occurrence of these species in this region used 743 bp sequences of the mitochondrial cytochrome b gene in 181 specimens from 42 local, including sequences such as GenBank reference. The phylogeny inferred bayesian revealed only two species proposed for the South Brazil: *O. nasutus* and *O. quaestor*. The *O. dasytrichus*, not described as occurring before the southern region, is evidenced by phylogenetic support. A sample (P495), collected in the Paraná Cerrado portion appears as conflicting with deposited sequences, potentially being a new species of *Oxymycterus* to the South of Brazil. The phylogenetic relationships among species were consistent with those proposed in the literature using sequences from the database.

#### REFERÊNCIAS

AVISE, J. C. Phylogeography: The History and Formation of Species. **Harvard University Press**, Cambridge, Massachusetts. 2000.

BONVICINO, C. R. **Guia dos Roedores do Brasil**, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos C. R. Bonvicino, J. A. Oliveira, P. S. D'Andrea. - Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, 2008.

BOUCKAERT, R. R.; HELED, J.; KUEHNERT, D.; VAUGHAN, T. G.; WU, C-H.; XIE, D.; SUCHARD, M. A.; RAMBAUT, A.; DRUMMOND, A. J. BEAST 2: A software platform for Bayesian evolutionary analysis. **PLoS Computational Biology** 10(4): e1003537. 2014.

BRADLEY, R. D.; BAKER, R. J. A test of the genetic species concept: cytochrome-b sequences and mammals. **Journal of Mammalogy** 82: 960-973. 2001.

BICKFORD, D.; LOHMAN, D. J.; SOHDI, N. S.; PETER, Ng. K. L.; MEIER, R.; WINKER, K.; KRISTA, I. K.; DAS, I. Cryptic species as a window on diversity and conservation. **Trends in Ecology and Evolution** 22: 148-155. 2007.

D'ÉLIA, G. Phylogenetics of Sigmodontinae (Rodentia, Muroidea, Cricetidae), with special reference to the Akodont group, and with additional comments on historical Biogeography. **Cladistics**, (19) 307-323. 2003.

OLIVEIRA, J.A.; SILVEIRA, G.; ROCHA, V.J.; SILVA, C.E.F. Ordem Rodentia. In: REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; MARIÑO, H.F.; ROCHA, V.J. (orgs). **Mamíferos da Fazenda Monte Alegre - Paraná**. Londrina: Eduep, p.161-191, 2005.

OLIVEIRA, J.A.; BONVICINO, C.R. Ordem Rodentia. In N.R. Reis, A.L. Peracchi, W.A. Pedro, & I.P. Lima (eds.). **Mamíferos do Brasil**. **Imprensa da UEL**, Londrina, p. 347-406. 2006.

CARLETON, M. D. A survey of gross stomach morphology in New World *Cricetinae* (Rodentia, Muroidea), with comments on functional interpretations. **Miscellaneous Publications Museum of Zoology**, University of Michigan 146: 1-43, 1973.

SVARTMAN, M.; ALMEIDA, E. J. C. de. The karyotype of *Oxymycterus* sp (Cricetidae, Rodentia) from Central Brazil. **Journal Experimentia**. Volume 49, Issue 8 pp 718-720, 1993.

D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J.; TETA, P.; PATTON, J.L. Definition and diagnosis of a new tribe of sigmodontine rodents (Cricetidae: Sigmodontinae), and a revised classification of the subfamily. **Gayana** 71(2):187–194, 2007.

DRUMMOND, A. J.; RAMBAUT, A. Beast: Bayesian evolutionary analysis by sampling trees. **BMC Evolutionary Biology**. 7: 214. doi: 10.1186/1471-2148-7-214. 2007.

GONÇALVES, P.R., OLIVEIRA, J. A. de. Morphological and Genetic Variation between Two Sympatric Forms of *Oxymycterus* (Rodentia: Sigmodontinae): An Evaluation of Hypotheses of Differentiation within the Genus. **Journal of Mammalogy** 85(1):148-161. 2004.

HERSHKOVITZ, P. The description of a new species of South American holicudo, or long-nose mouse genus *Oxymycterus* (Sigmodontinae, Muroidea), with a critical review of the generic content. **Fieldiana: Zoology** (New Series) 1460:1–43, 1994.

HOFFMANN, F. G.; LESSA, E. P.; SMITH, M. F. Systematics of *Oxymycterus* with description of a new species from Uruguay. **Journal of Mammalogy**. 83(2): 408-420. 2002.

JAYAT, J.P.; D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J.; MIOTTI, M.D.; ORTIZ, P.E. A new species of the genus *Oxymycterus* (Mammalia: Rodentia: Cricetidae) from the vanishing Yungas of Argentina. **Zootaxa** 1911: 31–51, 2008.

KIMURA, M. A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. **Journal of molecular evolution** 16: 111–120. 1980.

MUSSER, G. G.; CARLETON, M. D. *Superfamily Muroidea*. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.). *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*. 3. ed. Baltimore: **John Hopkins University Press**, v. 2, p. 894-1531, 2005.

NEI, M. **Molecular Evolutionary Genetics**. Columbia University Press, New York, NY, USA. 1987.

NEI, M.; JIN, L. Variances of the average numbers of nucleotide substitutions within and between populations. **Molecular Biology and Evolution**. 6(3): 290–300. 1989.

NYLANDER, J. A. A. Bayesian phylogenetics and the evolution of gall wasps. (MrModeltest v2). **Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology**, ISSN 1104-232X; 937. 2004.

OLIVEIRA, J. A. Morphometric assessment of species groups in the South American rodent genus *Oxymycterus* (Sigmodontinae), with taxonomic notes base on the analysis of type material. **Tese de doutorado**, Texas Tech University, 320 p, 1998.

PARADA, A.; PARDIÑAS, U. F. J.; *et al.* Dating na impressive Neotropical radiation: Molecular time estimates for the Sigmodontinae (Rodentia) provide insights into its historical biogeography. **Molecular Phylogenetics and Evolution** 66. 960-968. 2013.

REIG, O. A. An assessment of the systematics and evolution of the Akodontini, with description of new fossil species of *Akodon* (Cricetidae, Sigmodontinae) In: *Studies in Neotropical Mammalogy. Essays in Honor of Philip Hershkovitz*. Chicago: **Fieldiana Zoology**; pp. 347–399, 1987.

ROZAS, J.; LIBRADO, P.; SÁNCHEZ-DEL BARRIO, J. C.; MESSEGUER, X.; ROZAS, R. **DnaSP Version 5 Help Contents** [Help File]. Available with the program at <http://www.ub.edu/dnasp/>. 2010.

SBALQUEIRO, I. J. Análises cromossômicas e filogenéticas em algumas espécies de roedores da Região Sul. Porto Alegre, **Tese de Doutorado**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1989.

SMITH, M. F. e PATTON, J. L. Phylogenetic relationships and the radiation of sigmodontine rodents in South America: evidence from cytochrome b. J. **Journal of Mammalian Evolution**. 6, 89–128. 1999.

SMITH, M. F.; PATTON, J. L. The diversification of South American murid rodents: evidence from mitochondrial DNA sequence data for the akodontine tribe. **Biological Journal of the Linnean Society** 50:149-177. 1993.

TAMURA, K.; PETERSON, D.; PETERSON, N.; STECHER, G.; NEI, M.; KUMAR, S. MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. **Molecular Biology and Evolution**. 28:2731–2739, 2011.

Anexo I – Tabela 3. Lista de espécimes de *Oxymycterus* sp. utilizados no presente estudo, incluindo: coleção de depósito, código de identificação, localidade de amostragem e as coordenadas geográficas. Siglas das coleções e Universidades depositadas estão a seguir. Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Fundação Universidade de Blumenau (FURB).

Depósito	Referência	Localidade/Município	Estado	Latitude	Longitude
FURB	449	Anitápolis	SC	-27,901944	-49,128889
FURB	510	Anitápolis	SC	-27,901944	-49,128889
FURB	511	Anitápolis	SC	-27,901944	-49,128889
FURB	621	Blumenau	SC	-26,908889	-49,072222
FURB	901	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	999	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	5005	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	5014	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	5047	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5074	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5092	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5234	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	5936	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	6249	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
FURB	6250	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
FURB	6502	Itá	SC	-27,290833	-52,322778
FURB	9090	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9124	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9170	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9193	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9215	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9220	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9224	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9240	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	9333	Indaial	SC	26,897778	-49,231944
FURB	9365	Água Doce	SC	-26,997778	-51,555833
FURB	9653	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9679	Blumenau	SC	-26,908889	-49,072222



FURB	9682	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9768	Gaspar	SC	-26,930833	-48,958889
FURB	9808	Gaspar	SC	-26,930833	-48,958889
FURB	9825	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9856	Água Doce	SC	-26,997778	-51,555833
FURB	9983	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	12004	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	12094	Luiz Alves	SC	-26,720833	-48,932778
FURB	12276	Faxinal dos Guedes	SC	-26,852778	-52,261001
FURB	12615	Ibirama	SC	-27,056944	-49,517778
FURB	12654	Ibirama	SC	-27,056944	-49,517778
FURB	15106	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15135	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15140	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15145	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15154	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15160	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15171	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15788	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	18041	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	18119	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	18153	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	18228	Candói	PR	-25,570833	-52,052778
FURB	18598	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	18669	Itapoá	SC	-26,116944	-48,6158
FURB	18723	Dr. Pedrinho	SC	-26,713889	-49,482778
FURB	20078	São José do Cerrito	SC	-27,662778	-50,581001
FURB	20520	Abdon Batista	SC	-27,610833	-51,022778
FURB	20526	Abdon Batista	SC	-27,610833	-51,022778
UFPR	P42	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P44	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P50	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P53	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P54	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P56	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P59	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P60	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P62	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P65	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P76	Ponta Grossa/Vila Velha	PR	-25,095	-50,161944
UFPR	P86	Curitiba/Mata da Varzea	PR	-25,429722	-49,271944
UFPR	P87	Curitiba/Mata da Varzea	PR	-25,429722	-49,271944
UFPR	P119	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P124	São Mateus do Sul/Fazenda Durgo	PR	-25,873889	-50,382778
UFPR	P177	Marumbi/Bacia do Rio do Nunes	PR	-25,346916	-48,76826
UFPR	P371	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P372	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P373	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P374	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P375	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P376	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P377	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P403	São José dos Pinhais/Guaricana	PR	-25,717171	-49,135068
UFPR	P495	Jaguariaíva/Faz. Cha. do Sto Antônio	PR	-24,250833	-49,705833
UFPR	P752	Guaraqueçaba/Índios	PR	-25,306944	-48,3288
UFPR	P754	Guaraqueçaba/Índios	PR	-25,306944	-48,3288
UFPR	P757	Guaraqueçaba/Massarapuã	PR	-25,345051	-48,434984

UFPR	P760	Guaraqueçaba/Índios	PR	-25,306944	-48,3288
UFPR	P969	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P970	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P973	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P980	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P995	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1008	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1018	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1019	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1039	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1049	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1051	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1053	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1055	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1061	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1099	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFRGS	ALV 16	PA Lagoa Verde- Rio Grande	RS	-32,139934	-52,181064
UFRGS	HL 11	Herval	RS	-32,023889	-53,395833
UFRGS	CAM 09	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 12	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 13	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 15	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 21	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 34	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 01	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 02	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 05	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 07	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 08	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 10	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 30	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 43	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 44	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 47	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 63	Cristal	RS	-31,002778	-52,05
UFRGS	FQ 72	Cristal	RS	-31,002778	-52,05
UFRGS	GUA 04	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 05	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 06	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 07	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 12	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 13	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 17	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 18	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 19	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 20	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 21	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 22	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	HFE 01	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 02	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 03	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 04	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 05	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	MEV 01	Mata Estrada Velha-Rio Grande	RS	-32,035	-52,098889
UFRGS	MEV 02	Mata Estrada Velha-Rio Grande	RS	-32,035	-52,098889
UFRGS	PL 17	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 44	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778

UFRGS	PL 200	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 201	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 300	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	POS 18	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 20	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 25	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 27	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	PRM 13	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	AS 17	Cambará do Sul (Aparados da Serra)	RS	-29,191667	-50,0975
UFRGS	AS 05	Cambará do Sul (Aparados da Serra)	RS	-29,191667	-50,0975
UFRGS	PET 30	Cambará do Sul (Pq. Est. de Tainhas)	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PET 31	Cambará do Sul (Pq. Est. de Tainhas)	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PET 35	Cambará do Sul (Pq. Est. de Tainhas)	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PET 44	Cambará do Sul (Pq. Est. de Tainhas)	RS	-29,084606	-50,366
UFRGS	PRM 129	Pró-Mata/São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PRM 105	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	RIB 20	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	SLS 07	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 08	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 13	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 14	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 17	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	PM 47	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 65	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 66	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 70	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 74	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 76	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 79	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 80	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 86	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 87	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 91	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 99	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 100	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 104	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	TAI 40	ESEC Taim- Rio Grande	RS	-32,7425	-52,574444
UFRGS	TAP 03	Tapes	RS	-30,72778	-51,395833
UFRGS	FQ 105	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325

Anexo II - Tabela 4. Sequências parciais (743 pares de base) do gene mitocondrial citocromo *b* utilizadas na análise filogenética e comparações de distância genética no gênero *Oxymycterus*, obtidas a partir da base de dados de acesso público Genbank. Para todas as sequências são fornecidos o número de acesso e a correspondente referência.

#	Táxon	Número de acesso (Genbank)	Referência
1	<i>O. hiska</i>	U03542	Smith e Patton (1993)
2	<i>O. nasutus</i>	DQ518258	Jayat <i>et al.</i> (2008)
3	<i>O. nasutus</i>	EF661854	Montes <i>et al.</i> (2008)
4	<i>O. nasutus</i>	AF175286	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
5	<i>O. nasutus</i>	AF175287	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
6	<i>O. josei</i>	AF175288	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
7	<i>O. josei</i>	AF175289	Hoffman <i>et al.</i> (2002)

8	<i>O. misionalis</i>	DQ518257	Jayat <i>et al.</i> (2008)
9	<i>O. misionalis</i>	EU449517	D'Elia <i>et al.</i> (2008)
10	<i>O. amazonicus</i>	AF454765	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
11	<i>O. delator</i>	AF454766	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
12	<i>O. delator</i>	AF454767	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
13	<i>O. delator</i>	U03525	Smith e Patton (1993)
14	<i>O. delator</i>	DQ518256	Jayat <i>et al.</i> (2008)
15	<i>O. delator</i>	AY275125	D'Elia (2003)
16	<i>O. dasytrichus</i>	AF454768	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
17	<i>O. dasytrichus</i>	AF454769	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
18	<i>O. dasytrichus</i>	AF454770	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
19	<i>O. dasytrichus</i>	AF454771	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
20	<i>O. dasytrichus</i>	AF516662	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
21	<i>O. dasytrichus</i>	AF516659	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
22	<i>O. dasytrichus</i>	AF516658	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
23	<i>O. dasytrichus</i>	AF516657	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
24	<i>O. dasytrichus</i>	AF516663	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
25	<i>O. dasytrichus</i>	AF516664	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
26	<i>O. dasytrichus</i>	AF516665	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
27	<i>O. quaestor</i>	AF454772	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
28	<i>O. quaestor</i>	AF516660	Gonçalves e Oliveira (2004)
29	<i>O. quaestor</i>	AF516661	Gonçalves e Oliveira (2004)
30	<i>O. judex</i>	AF454773	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
31	<i>O. judex</i>	AF454774	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
32	<i>O. rufus</i>	AF454775	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
33	<i>O. rufus</i>	AF454776	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
34	<i>O. rufus</i>	AF454777	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
35	<i>O. rufus</i>	AF516652	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
36	<i>O. rufus</i>	AF516651	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
37	<i>O. rufus</i>	AF516653	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
38	<i>O. rufus</i>	AF516654	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
39	<i>O. rufus</i>	AF516655	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
40	<i>O. rufus</i>	AF516666	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
41	<i>O. rufus</i>	AF516667	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
42	<i>O. rufus</i>	AF516668	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
43	<i>O. rufus</i>	AF516669	Hoffman <i>et al.</i> (2002)
44	<i>O. rufus</i>	AY275126	D'Elia (2003)
45	<i>O. rufus</i>	AY275127	D'Elia (2003)
46	<i>O. paramensis</i>	DQ518259	Jayat <i>et al.</i> (2008)
47	<i>O. paramensis</i>	DQ518260	Jayat <i>et al.</i> (2008)
48	<i>O. paramensis</i>	DQ518261	Jayat <i>et al.</i> (2008)
49	<i>O. wayku</i>	DQ518262	Jayat <i>et al.</i> (2008)

---

### 10.3 ARTIGO CIENTÍFICO II

**Título:** “FILOGEOGRAFIA DO ROEDOR *Oxymycterus nasutus* (CRICETIDAE: SIGMODONTINAE) NO SUL DO BRASIL: PADRÕES DE DIFERENCIAÇÃO EM LINHAGENS ASSOCIADOS A BIOMAS”.

**Revista:** *Mammalian Biology*

# FILOGEOGRAFIA DO ROEDOR *Oxymycterus nasutus* (CRICETIDAE: SIGMODONTINAE) NO SUL DO BRASIL: PADRÕES DE DIFERENCIAÇÃO DE LINHAGENS ASSOCIADOS A BIOMAS

Willian Thomaz Peçanha<sup>1</sup>; Gislene Lopes Gonçalves<sup>2</sup>; Fernando Marques Quintela<sup>3</sup>; Sérgio Luiz Althoff<sup>4</sup>; Thales Renato O. de Freitas<sup>1,2,3</sup>; Iris Hass<sup>1</sup>

1. Programa de Pós-Graduação em Genética – UFPR.
2. Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular - UFRGS
3. Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal – UFRGS
4. Departamento de Biologia – FURB

Correio eletrônico do autor: [wthomaz90@gmail.com](mailto:wthomaz90@gmail.com)

Periódico a ser submetido: *Mammalian Biology*.

## RESUMO

*Oxymycterus nasutus* (Waterhouse, 1837) é um roedor com uma restrita distribuição ao longo da América do Sul, ocorrendo desde o Uruguai ao Brasil Meridional. A espécie possui uma distribuição geográfica, ocorrendo em mais de uma formação fitofisionômica ou biomas, em simpatria com congêneres de “distribuição restrita”. Investigando a estrutura genética, padrões filogeográficos deste roedor sigmodontíneo, avaliou-se 743 pb de fragmento do genoma mitocondrial (gene citocromo *b*) de 115 espécimes de 26 localidades do sul do Brasil. Os resultados da filogenia obtida, e demais parâmetros populacionais, revelam uma baixa estruturação genética, embora exista uma tendência de agrupamento dos haplótipos das linhagens propostas (Planalto x Planície). É discutida a distribuição da variação genética intraespecífica e as formações geológicas e florestais onde a espécie ocorre. Com base na evidência molecular, sugerimos que exista um processo em andamento de separação em distintas linhagens dentro da espécie.

Palavras-Chave: Citocromo *b*, DNA mitocondrial, Filogenia molecular, Rodentia

## ABSTRACT

*Oxymycterus nasutus* (Waterhouse, 1837) is a rodent with a restricted distribution throughout South America, occurring from Uruguay to southern Brazil. The species has a geographical distribution, occurring in more than one training vegetation types or biomes, with sympatric congeners "restricted distribution". Investigating the genetic structure, phylogeographic patterns of this Sigmodontinae rodent, we evaluated 743 bp fragment of

the mitochondrial genome (gene cytochrome b) of 115 specimens from 26 localities in southern Brazil. The results of the phylogeny obtained, and other population parameters, show low genetic structure, although there is a trend of clustering of haplotypes of the lines proposed (Plateau x Plain). The distribution is discussed of intraspecific genetic variation and the geological and forest formations where the species occurs. Based on molecular evidence, we suggest that there is an ongoing process of separation into distinct lineages within species.

Keywords: Cytochrome b, mitochondrial DNA, molecular phylogeny, Rodentia

## INTRODUÇÃO

Possuindo 86 gêneros existentes e aproximadamente 400 espécies, a subfamília Sigmodontinae (família Cricetidae) é um dos mais diversos e complexos grupos de mamíferos, e é predominantemente distribuída na América do Sul (PARADA *et al.* 2013; VENTURA *et al.*, 2013; D'ELIA, 2003). Esta subfamília está representada por nove tribos: Oryzomyini, Akodontini, Sigmodontini, Ichthyomyini, Thomasomyini, Wiedomyini, Phyllotini, Reithrodontini e Abrotrichini (D'ELIA *et al.*, 2007). Devido a sua diversidade, os sigmodontíneos têm sido alvo de diversos estudos sobre sua diversidade de formas, relações sistemáticas e irradiação adaptativa, a fim de estabelecer sua história evolutiva (BASKIN 1978; D'ELIA, 2003; ENGEL *et al.*, 1998; HERSHKOVITZ, 1966; PATTERSON e PASCUAL, 1972; SMITH e PATTON, 1993, 1999). Entre os sigmodontíneos destaca-se a tribo Akodontini, segunda tribo mais diversa com aproximadamente 35% da total da diversidade da subfamília (MUSSER e CARLETON, 2005), além disso, é caracterizada por sua forma semelhante ao rato, com hábitos que variam de onívoros a insetívoros (REIG, 1981, 1984). A Tribo apresenta uma ampla distribuição geográfica, sendo que a maior parte de seus gêneros e espécies está concentrada nas regiões mais centrais da Cordilheira dos Andes, que é proposta como sendo a área original de diferenciação dos akodontinos (REIG 1984, 1987). O grupo é morfologicamente diverso e amplamente distribuído na América do Sul, com exceção da Amazônia, ocupa uma variedade de habitats, tanto de terra firme e de várzea. Ecologicamente, os Akodontinos também são um grupo diversificado, com amplitude de dietas, incluindo espécies fossoriais, semi-aquática e cursoriais (PARDINÁS *et al.*, 2002). Contudo Ab'Saber (1969) argumenta a

existência de três padrões geomorfológicos para a região Sul do Brasil; o Planalto Meridional, Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense e a Planície Costeira/RS.

O Planalto Meridional é dominado por terrenos sedimentares recobertos parcialmente por lavas vulcânicas (basalto), e na região Sul do Brasil se estende desde o Estado do Paraná ao Norte do Rio Grande do Sul (AB'SABER, 1969). Sob o Planalto Meridional da região Sul do Brasil, está inserida a Mata Atlântica (Bioma), e segundo Pillar *et al.* (2009) os ecossistemas florestais da região sul do Brasil é a Floresta Ombrófila Densa - FOD, Floresta Ombrófila Mista - FOM (Floresta de Araucária) e Florestas Estacionais. Outras classificações reunindo aspectos de vegetação, geomorfológicos e climáticos (AB'SABER, 1969; CPRM, 2006) descreve que parte da Região Sul do Brasil (PR, SC e Norte do RS) está inserida sobre dois domínios morfoclimáticos: I) Domínio dos Planaltos Úmidos Subtropicais da Mata de Araucária, um domínio morfoclimático de floresta de coníferas de clima temperado situado no interior dos estados do Paraná e Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. II) Domínio de Mares e Morros, situado região leste (litoral brasileiro), onde se encontra a Floresta Atlântica que possui clima diversificado.

Uma característica do Planalto Meridional do RS é a Escarpa da Serra Geral. Com vegetação de porte florestal da Mata Atlântica, essa região consiste em um relevo de transição entre o Planalto dos Campos Gerais e a Planície Costeira (CRPM 2008; CRPM 2010).

O Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense (referido como Escudo Rio Grandense por alguns autores) e a Planície Costeira/RS estão situados na porção Centro-Meridional do Estado do Rio Grande do Sul. A geomorfologia do Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense é caracterizada pela perda de sedimentos, de rochas cristalinas cristalofilianas pré-cambrianas, e a Planície Costeira/RS é caracterizada pelo inverso, ou seja, o processo sedimentar estaria se sobrepondo ao processo erosivo independentemente das cotas altimétricas (AB'SABER, 1969). Nestas regiões (Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense e a Planície Costeira/RS), o Bioma dominante é o Pampa. A vegetação é dominada por gramíneas que formam extensos campos delimitados pelas florestas ripárias (PILLAR *et al.* 2009). O relevo desse bioma varia de suave-ondulado no Centro do estado à forte-ondulado na Serra do Sudeste e na divisa com a Argentina e nas regiões litorâneas os campos possuem uma grande extensão plana (PILLAR *et al.* 2009). A Planície Costeira



do Rio Grande do Sul possui uma área de 33.000 km<sup>2</sup> e mais de 100 km de largura, e é a mais ampla planície costeira do Brasil, estendendo-se por cerca de 620 km, desde a cidade de Torres, ao norte, até a desembocadura do Arroio Chuí, ao sul (TOMAZELLI e VILLWOCK, 2000). Esta região compreende uma faixa alongada de extensos campos de dunas, planícies e terraços marinhos e banhados estendendo-se na zona litorânea entre Santa Catarina e o Chuí (CRPM, 2008). Exceto pela Planície Costeira/RS, as demais regiões do Rio Grande do Sul são tradicionalmente denominadas como Campanha Gaúcha, denominadas por alguns autores como Domínio das Coxilhas Úmidas Subtropicais da Campanha Gaúcha, que compreende o Domínio sul do Rio Grande do Sul (AB'SABER, 1969; CPRM, 2006).

Com uma abrangente distribuição na América do Sul, incluindo registros do Norte da Argentina, Andes, Uruguai à região periférica Amazônica o gênero *Akodontino* *Oxymycterus* ocupa vários habitats no subcontinente (HERSHKOVITZ, 1994). Entretanto, este apresenta limitadas inferências filogenéticas, onde os limites entre as espécies, padrões filogeográficas e distribuição geográfica são pouco compreendidos e/ou explorados, levando uma complexa história taxonômica (OLIVEIRA, 1998; JAYAT *et al.*, 2008). De discreta variação citogenética ( $2n = 54$  e  $NF_A = 64$ ) e morfologia muito semelhante, entre todas as suas espécies, alguns autores tem utilizado marcadores moleculares e/ou medidas craniométricas com o intuito de contribuir para a elucidação taxonômica deste gênero, discutindo as relações intraespecíficas, e inclusive propondo novas espécies. (SBALQUEIRO, 1989; HERSHKOVITZ 1994; OLIVEIRA, 1998; HOFFMANN *et al.*, 2002; GONÇALVES e OLIVEIRA, 2004; D'ELÍA *et al.*, 2007; JAYAT *et al.*, 2008).

A espécie *Oxymycterus nasutus* (Waterhouse, 1837), segundo a literatura ocorre desde o Uruguai a toda porção leste do sul e sudeste do Brasil (do Rio Grande do Sul a São Paulo), desde o nível do mar até altitudes elevadas da Serra Geral, até os estados de Santa Catarina e Paraná, onde está restrito às altitudes elevadas das montanhas costeiras, sendo sua localidade tipo o Uruguai, Departamento de Maldonado, Maldonado (OLIVEIRA, 1998; MUSSER e CARLETON, 2005). Assim como as demais espécies do seu gênero, característica mais evidente são suas garras bem desenvolvidas e focinho longo, cauda geralmente pouco pilosa e com as escamas aparentes, pêlos ungueais (próximo às patas) escuros e escassos (BONVICINO, 2008). Semelhante a outras

espécies do presente gênero, *O. nasutus* é semifossorial e altamente insetívoro (GONZALEZ, 2001).

Este roedor pode ser encontrado acima de 400-500 m, dependendo da latitude, mas também ocorrendo em zonas úmidas, restingas costeiras, pastagens e as bordas de riachos (GONZALEZ, 2001), possuindo um padrão bifásico diurno com alguma atividade noturna, influenciado pela luz do ambiente (PAISE e VIEIRA, 2006). Esta espécie é considerada de pequeno porte, podendo variar de 140-158 centímetros, sendo sua massa corporal variando de 27-78 gramas (HERSHKOVITZ, 1994; OLIVEIRA, 1998). Em relação a sua distribuição geográfica é simpátrico a *O. josei*, *O. rufus*, *O. judex* e *O. quaestor* (HERSHKOVITZ, 1994; HOFFMAN *et al.*, 2002, OLIVEIRA, 1998).

Este estudo tem como objetivo verificar a existência de padrões de linhagens nos exemplares de *O. nasutus*, utilizando como base o gene mitocondrial citocromo *b* (*cyt b*) em filogenia, rede haplotípica e outros parâmetros genéticos, com fins de caracterizar as linhagens propostas de Planalto Meridional (espécimes inseridos no Bioma Mata Atlântica) e de Planície Costeira (no Bioma Pampeano).

## METODOLOGIA

### *Amostragem*

Um total de 115 espécimes de *Oxymycterus nasutus* de 26 localidades foi amostrado ao longo da região Sul do Brasil (Figura 1). Além do panorama amostral, quatro sequências obtidas a partir do Genbank (DQ518258, EF661854, AF175286 e AF175287), além do Akodontino *Juscelinomys huanchacae* (Genbank: JQ898084), como grupo externo, foram utilizados para a análise de Inferência Bayesiana.

Os espécimes analisados procedem de localidades dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e encontram-se tombados nas seguintes instituições: Coleção de mamíferos do Laboratório de Citogenética e Conservação Animal (CGC Animal/UFPR) da Universidade Federal do Paraná – UFPR; Coleção de mamíferos da Fundação Universidade de Blumenau - FURB, Blumenau, Santa Catarina; Coleção de mamíferos do Laboratório de Citogenética e Evolução da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (Anexo I).

## *Procedimentos em Laboratório*

O DNA foi extraído a partir de rim, fígado, coração ou músculo (armazenados a -20° C ou em etanol a 70%) utilizando o kit de extração PureLink® Genomic DNA (Invitrogen, Life Technologies), seguindo instruções do fabricante. As sequências do gene mitocondrial citocromo *b* foram obtidas por reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando os iniciadores MVZ 05 (cadeia leve) e MVZ 16 (cadeia pesada) (SMITH e PATTON, 1993), com as seguintes condições: 94°C durante 3 min; 35 ciclos de 94°C por 20s, 45°C por 15s, 72°C para 60s, e 72°C por 7 min. Os produtos de PCR foram purificados com exonuclease I e fosfatase alcalina (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ) e, sequenciados pela empresa MacroGen, Inc. (Seul, Coreia do Sul).

## *Alinhamento, descrição e análises genéticas*

Para a edição e alinhamento das sequências utilizou-se o programa MEGA v6 (TAMURA *et al.*, 2011). As sequências geradas serão depositadas nas bases de dados Genbank. Análises de distancia evolutivas foram calculadas utilizando os critérios de Kimura 2-parâmetros (KIMURA, 1980) através do software MEGA v6. Medidas padrão de variabilidade genética, como número de sítio variáveis (S), diversidade haplotípica (Hd) (NEI, 1987) e nucleotídica ( $\pi$ ) (NEI e JIN, 1989) foram feitas através do programa DnaSP v5 (ROZAS *et al.*, 2010).

A filogenia foi reconstruída por inferência bayesiana através do programa BEAST v2 (BOUCKAERT *et al.*, 2014) utilizando 743 pares de base (pb) de sequencias do gene mitocondrial citocromo *b* dos exemplares de *O. nasutus*. O modelo de substituição nucleotídica foi estimado utilizando o programa MrModeltest v2.3 (NYLANDER, 2004), seguindo o critério de informação de Akaike. Duas corridas independentes de cadeias de Markov e Montecarlo (MCMC) foram realizadas com 25 milhões de gerações e a amostragem das árvores foi feita a cada 2500 gerações. O tamanho efetivo dos parâmetros de amostragem das cadeias de MCMC ( $> 200$  ESS) foi verificado usando o software Tracer v1.5 (<http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/>). Duas corridas independentes foram sumarizadas no software TreeAnnotator v1.6.2 (DRUMMOND e RAMBAUT, 2007), onde as primeiras árvores (~10%) foram descartadas e o restante

usado para inferir uma árvore *a posteriori*, visualizada no programa Figtree v1.3.1 ([http://tree.bio.ed.ac.uk / software / figtree /](http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/)).

Para avaliar as relações evolutivas entre as sequências utilizou-se o programa DnaSP v5 para obtenção dos haplótipos das sequências geradas. As relações intraespecíficas, i.e., avaliação da estrutura populacional, foram estabelecidas com base em redes de haplótipos construídas no programa Network v4.6 (<http://www.fluxus-engineering.com>) utilizando o critério de Median-Joining (BANDELT *et al.*, 1999). A estimativa de diversidade de haplótipos e nucleotídeos foi feita no software DnaSP v 5. Eventos passados, como expansão ou redução populacional, foram inferidos com base em estimativas dos testes de neutralidade, como D de Tajima (TAJIMA, 1989), Fs de Fu (FU, 1997).

## RESULTADOS

Foram analisados 115 sequências do *O. nasutus* oriundas de 26 localidades do Sul do Brasil (Figura 1), e foram identificados 44 sítios polimórficos definindo 31 haplótipos. A diversidade haplotípica total foi de (Hd) 0,90831 e a diversidade nucleotídica ( $\pi$ ) em 0,01030 (Tabela 2). Um único haplótipo (H08) foi compartilhado entre os Biomas da Mata Atlântica (Planalto Meridional) e do Pampa (Planície Costeira). Adicionalmente, as análises revelam uma distancia genética com base no cyt *b* intraespecífica de 1,34% entre as amostras de Planalto Meridional e Planície Costeira. Demais parâmetros obtidos estão na Tabela 2.

Todos os espécimes amostrados, concordantes com a espécie *O. nasutus*, foram baseados nos valores de Probabilidade Posterior Bayesiana (PPB = 1) (Figura 2). Considerando o panorama amostral, verifica-se a existência de dois polos (gradientes) de distribuição entre os espécimes coletados no Planalto Meridional (Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul) e da Planície Costeira (Litoral do Rio Grande do Sul). Entretanto apesar a do alto suporte dos ramos (PPB= 1), não se verifica total distinção entre a linhagem de Planalto e de Planície, de acordo com a filogenia deste trabalho (Figura 2). Para explorar a variabilidade genética dentro da espécie *O. nasutus* associada a aspectos geográficos e da fisionomia geológica da região Meridional, em especial a

estruturação Planície vs. Planalto, o que não ficou completamente resolvido na filogenia reconstruída (encontrou-se estrutura de mais de dois grupos), construiu-se uma rede de haplótipos através do método de *median-joining* com as 115 amostras distribuídas ao longo do sul do Brasil, que gerou 31 haplótipos (Figura 3). Destaca-se o padrão de distribuição haplotípica segregado Planalto Meridional e Planície Costeira (Figura 1). Apesar de observada a estruturação entre as duas grandes formações fisionômicas (referidos também como linhagens), verifica-se o compartilhamento do haplótipo H8 por espécimes das duas linhagens propostas (Tabela 1).



**Figura 1.** Distribuição do *Oxymycterus nasutus* determinado pela inferência bayesiana (cyt *b*) ao longo do Planalto Meridional (inseridos na Mata Atlântica) e na Planície Costeira (no Pampa) no sul do Brasil. Os pontos e letras indicam as localidades da amostragem (presentes na Tab. 1). Em tom mais escuro o Bioma Mata Atlântico, e mais claro o Pampa.

**Tabela 1.** Lista de haplótipos utilizados para construção da rede haplotípica do *O. nasutus*, assim como localidades ilustradas na Figura 16.

Ponto	n**	Estado	Localidade	Latitude	Longitude	Haplótipos
a	2	PR	Piraquara	-25,4297	-49,2719	H18
b	15	PR	São José dos Pinhais/Barro Preto	-25,5799	-49,1754	H18
c	9	PR	Mata da Várzea- Curitiba	-25,4419	-49,0628	H18, H20, H21 e H22
d	1	PR	Ponta Grossa/Vila Velha	-25,095	-50,1619	H23
e	1	PR	São Mateus do Sul/Fazenda Durgo	-25,8739	-50,3828	H19
f	1	PR	Candói	-25,5708	-52,0528	H3
g	2	SC	São Domingos	-26,5578	-52,5319	H2
h	2	SC	Água Doce	-26,9978	-51,5558	H5 e H6
i	1	SC	Abdon Batista	-27,6108	-51,0228	H1
j	3	SC	Campo Belo do Sul	-27,8989	-50,7608	H1
k	1	SC	Indaial	-26,8978	-49,2319	H2
l	4	RS	Erechim	-27,6339	-52,2739	H1
m	2	RS	Cambará do Sul <sup>1</sup>	-29,1917	-50,0975	H8
n	17	RS	Pró-Mata /São Francisco de Paula	-29,5508	-50,2765	H8, H26, H27 e H28
o	13	RS	Guaíba	-30,1139	-51,325	H12 e H13
p	7	RS	Barra do Ribeiro	-30,2908	-51,3008	H4, H12 e H31
q	12	RS	Camaquã	-30,8508	-51,8119	H4, H9, H10, H11 e H14
r	1	RS	Tapes	-30,7278	-51,3958	H24
s	2	RS	Cristal	-31,0028	-52,05	H4, H15
t*	5	RS	São Lourenço do Sul	-31,365	-51,9778	H8, H24
u	5	RS	HBTL-Pelotas	-31,7719	-52,3428	H24 e H25
v	4	RS	Pedro Osório-Ar. Moreira	-31,8639	-52,8228	H29 e H30
w	1	RS	Herval	-32,0239	-53,3958	H16
x	2	RS	Mata Estrada Velha-Rio Grande	-32,035	-52,0989	H17
y	1	RS	APA Lagoa Verde- Rio Grande	-32,1399	-52,1811	H7
z	1	RS	ESEC Taim- Rio Grande	-32,7425	-52,5744	H7

<sup>1</sup>Parque Nacional dos Aparados da Serra.

\*Localidade com haplótipo compartilhado entre as linhagens (H08).


\*\* n por localidade.

**Tabela 2.** Diversidade genética e resultados dos testes de neutralidade encontrados nas linhagens identificadas como *O. nasutus*, de acordo com a distribuição geográfica.

Linhagem	N	H	Hd	$\pi$	D	Fs
Planalto Meridional	61	15	0,79344	0,00680	-1,50746	-3,540
Planície Costeira	54	16	0,85535	0,00814	-1,32183	-5,740
Total	115	31	0,90831	0,01030	-1,55206	-11,746

\*Ind.: número de indivíduos; H: número de haplótipos; Hd: diversidade haplotípica;  $\pi$ : diversidade nucleotídica; D: teste de Tajima; Fs: teste de Fu;  $p > 0,01$ .





**Figura 3.** Rede de haplótipos construída utilizando o método *median-joining*, com base em sequências do *cyt b*, para os 115 indivíduos de *Oxymycterus nasutus*. Cada círculo compreende um haplótipo e o seu tamanho é proporcional à frequência. Cada traço nas linhas que conectam os haplótipos representa um passo mutacional. As cores correspondem a identificação dos haplótipos que foram inferidas utilizando a análise Bayesiana. Em tom escuro os espécimes da linhagem de Planalto Meridional, e em claro os espécimes de linhagem de Planície Costeira. O haplótipo H08 fora o compartilhado entre as linhagens.

## DISCUSSÃO

Neste estudo, relatamos a tendência de um padrão inédito de diferenciação latitudinal dos haplótipos a partir duas linhagens principais em *O. nasutus*, associado a barreira geográfica (serra geral) entre os espécimes. A filogenia mostra uma composição por dois clados maiores principais (linhagem Planalto e Planície) e um clado extremo-sul, restrito à



parte extremo sul do estado do Rio Grande do Sul (BR), embora este clado externo seja enquadrado como sendo de Planície nos demais parâmetros analisados (Figura 2). As relações entre as linhagens Planalto - Planície, e o clado do extremo sul (inclusive nas análises como linhagem de Planície) ainda não estão bem resolvidos, e precisam ser investigados em mais detalhes, também com marcadores nucleares.

No entanto, apesar da distância genética intraespecífica ser inferior ( $=1,34\%$  entre as linhagens) aos parâmetros propostos por Bradley e Baker (2001) e Avise (2000), ou seja,  $< 2\%$ , a estimativa de diferenciação populacional a partir da variância das frequências haplotípicas verificou um índice de fixação  $G_{ST}$  de 0,09, o que indica não haver estruturação populacional nesta espécie. O resultado de tal indicador pode ser observado na Figura 2, onde alguns haplótipos, de Planalto Meridional como de Planície Costeira, são polifiléticos dentro do clado fornecido pela Inferência Bayesiana. Encontram-se na Tabela 2 a diversidade nucleotídica total ( $\pi$ ) de 0,01030 e uma diversidade haplotípica total ( $H_d$ ) de 0,90831. Os altos valores de diversidade haplotípica e baixos valores de diversidade nucleotídica indicam que ocorreu expansão demográfica após um período de baixo tamanho populacional efetivo, o que poderia explicar o fato de não existir uma estruturação populacional sólida. Os valores negativos, mas não significativos obtidos para o teste  $D$  de Tajima para toda amostragem sugerem excesso de alelos raros para estas populações, indicando um processo de expansão populacional recente (TAJIMA, 1993). Como os testes de neutralidade  $D$  de Tajima e  $F_s$  de Fu não foram significativos ( $p > 0,01$ ) para nenhuma das populações analisadas, não se rejeita a hipótese de mutação neutra. Entretanto, Para explorar tal problemática, a rede de haplótipos construída através de *median-joining* gerou 31 haplótipos, destacando seu padrão de distribuição entre o Planalto Meridional e a Planície Costeira (Figura 3). Apesar da análise filogenética não apresentar uma estruturação, a rede haplotípica evidencia um padrão conspícuo de haplótipos do Planalto e da Planície.

A linhagem de Planalto revelou 15 haplótipos (61 espécimes), incluindo os haplótipos H18 (com 21 espécimes) e o H08 (17 espécimes). Possivelmente sendo os haplótipos mais antigos por estarem no centro da rede e geograficamente dispersos, enquanto os haplótipos mais novos estão no extremo da rede e geograficamente restritas. A linhagem de Planície obteve-se 16 haplótipos (54 espécimes), sendo o H12 com 17 espécimes compartilhando-o, sendo todos amostrados em Guaíba e Barra do Ribeiro (Rio Grande do

Sul). As demais localidades estão presentes na Tabela 1. Porém, São Lourenço do Sul (RS) foi à única localidade que apresentou haplótipos nas duas linhagens propostas (Planalto e Planície), embora restrita a uma amostra (sequência) compartilhada (SLS 13). O resultado da rede de haplótipos de *Oxymycterus nasutus* sugere que ela seja incluída na Categoria III, proposta por Avise (2000), que linhagens que são intimamente relacionadas, mas sejam geograficamente alopátricas (separadas geograficamente), pode ser explicada por dois processos: fluxo gênico recente e/ou contato histórico recente.

Considerando as localidades do Bioma Pampeano (Planície) e do Planalto Meridional apresentam marcas diferenças relativas aos domínios vegetação e aspectos geomorfológicos (VIEIRA, 1984; ROISENBERG e VIERO, 2000; TOMAZELLI e VILLWOCK, 2000). Com exceção do ponto amostral “k” (Figura 1), apontada como pertencente a Floresta Ombrófila Densa (FOD), e os pontos “m e n” ponto de transição entre Biomas, sendo a predominante a Mata Atlântica (Florestas Ombrófila Mista - Floresta Estacional) e o Pampa, o ponto “l” como de Floresta estacional, todos os demais pontos amostrais são definidos como de Planalto Meridional e de Floresta Ombrófila Mista (Florestas de Araucárias). Os espécimes amostrados no Bioma Pampa, de *O. nasutus*, no presente estudo, são oriundos de locais de Planície Costeira e borda do escudo Rio-Grandense, sendo ambas regiões definidas como tendo baixas cotas altimétricas (VIEIRA, 1984). Alguns autores sugerem que gradientes de altitude podem estar associados a processos de diferenciação em pequenos roedores (REIG, 1984; MONTGELARD e MATTHEE, 2012), e este fator pode estar associado ao processo interno de diferenciação em *O. nasutus*. Também não devem ser descartados os efeitos das dissimilaridades estruturais do habitat, fatores também relacionados a processos de divergência morfológica em pequenos mamíferos (ABIADH *et al.*, 2010; LALIS *et al.*, 2009).

Em conclusão, as análises filogeográficas aqui apresentadas, embora não estruturadas pela filogenia, fornecem novas informações sobre a distribuição do *O. nasutus* em regiões com diferentes cotas altimétricas associadas a diferentes padrões de fitofisionomias (Mata Atlântica e Pampa). Neste estudo, sugerimos a ocorrência de duas linhagens para esta espécie (linhagem de Planalto e de Planície) e que diferenças de altitude, ao longo de sua distribuição geográfica, pode ser o principal aspecto nesta distinção. Contudo, deve se levar em consideração a limitação do marcador utilizado, e

que, análise com outros marcadores, integrados com parâmetros morfológicos ainda poderá ser realizado para uma melhor compreensão das linhagens propostas.

AGRADECIMENTOS: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa concedida para atuação exclusiva neste trabalho.

## REFERÊNCIAS

AB'SABER, A. N. Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil. *Orientação*, São Paulo, n. 3, p. 45-48. 1969.

ABIADH, A.; COLANGELO, P.; CAPANNA, E.; LAMINE-CHENITI, T.; CHETOUI, M. Morphometric analysis of six *Gerbillus* species (Rodentia, Gerbillinae) from Tunisia. *Comptes Rendus Biologies* 333:680—687. 2010.

AVISE, J. C. *Phylogeography The History and Formation of Species*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 2000.

BANDELT, H-J.; FORSTER, P.; RÖHL, A. Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies. *BMC Evolutionary Biology*.16:37-48. 1999.

BASKIN, J. A. *Bensonmysis*, *Calomys*, and the origin of the phyllotine group of Neotropical cricetines (Rodentia, Cricetidae). *Journal Mammalogy*. 59:125—135. 1978.

BONVICINO, C. R. Guia dos Roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos C. R. Bonvicino, J. A. Oliveira, P. S. D'Andrea. - Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, 2008.

BOUCKAERT, R. R.; HELED, J.; KUEHNERT, D.; VAUGHAN, T. G.; WU, C-H.; XIE, D.; SUCHARD, M. A.; RAMBAUT, A.; DRUMMOND, A. J. BEAST 2: A software platform for Bayesian evolutionary analysis. *PLoS Computational Biology* 10(4): e1003537. 2014.

BRADLEY, R. D.; BAKER, R. J. A test of the genetic species concept: cytochrome-b sequences and mammals. *Journal of Mammalogy* 82: 960-973. 2001.

CPRM, Geodiversidade do estado do Rio Grande do Sul / Organização Ana Cláudia Viero [e] Diogo Rodrigues Andrade da Silva. – Porto Alegre: CPRM, 250p. 2010.

CPRM, Mapa geodiversidade do Brasil: Brasília: CPRM/SGM/MME. 2008.

CPRM, Mapa geodiversidade do Brasil: escala 1:2. 500. 000. Legenda expandida. Brasília: CPRM/SGM/MME. 68 p. il. 2006.

D'ÉLIA, G. Phylogenetics of Sigmodontinae (Rodentia, Muroidea, Cricetidae), with special reference to the Akodont group, and with additional comments on historical Biogeography. *Cladistics*, (19) 307-323. 2003.

D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J.; TETA, P.; PATTON, J.L. Definition and diagnosis of a new tribe of sigmodontine rodents (Cricetidae: Sigmodontinae), and a revised classification of the subfamily. *Gayana* 71(2):187–194, 2007.

DRUMMOND, A. J.; RAMBAUT, A. Beast: Bayesian evolutionary analysis by sampling trees. *BMC Evolutionary Biology* 7: 214. doi: 10.1186/1471-2148-7-214. 2007.

ENGEL, S. R.; HOGAN, K. M.; TAYLOR, J. F.; DAVIS, S. K. Molecular systematics and paleobiogeography of the South American Sigmodontinae Rodents. *Molecular Biology and Evolution*. 15: 35-49, 1998.

FU, Y. Statistical tests of neutrality of mutations against population growth, hitchhiking and background selection. *Genetics* 147: 915–925 9335623. 1997.

GONÇALVES, P.R., OLIVEIRA, J. A. de. Morphological and Genetic Variation between Two Sympatric Forms of *Oxymycterus* (Rodentia: Sigmodontinae): An Evaluation of Hypotheses of Differentiation within the Genus. *Journal of Mammalogy* 85(1):148-161. 2004.

GONZÁLEZ, E.M. Guía de campo de los mamíferos de Uruguay. Introducción al estudio de los mamíferos. Montevideo: Vida Silvestre, 339p. 2001.

HERSHKOVITZ, P. Mice, land bridges and Latin American faunal interchange. *Ectoparasites of Panama*. P 725-751. Field Museum of History Natural, Chicago. 1966.

HERSHKOVITZ, P. The description of a new species of South American holicudo, or long-nose mouse genus *Oxymycterus* (Sigmodontinae, Muroidea), with a critical review of the generic content. *Fieldiana: Zoology (New Series)* 1460:1–43, 1994.

HOFFMANN, F. G.; LESSA, E. P.; SMITH, M. F. Systematics of *Oxymycterus* with description of a new species from Uruguay. *Journal of Mammalogy*. 83(2): 408-420. 2002.

JAYAT, J.P.; D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U.F.J.; MIOTTI, M.D.; ORTIZ, P.E. A new species of the genus *Oxymycterus* (Mammalia: Rodentia: Cricetidae) from the vanishing Yungas of Argentina. *Zootaxa* 1911: 31–51, 2008.

KIMURA, M. A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. *Journal of molecular evolution* 16: 111–120. 1980.

LALIS, A.; BAYLAC, M.; COSSON, J. F.; MAKUNDI, R. H.; MACHANG'U, R. S.; DENYS, C. Cranial morphometric and fine scale genetic variability of two adjacent *Mastomys natalensis* (Rodentia: Muridae) populations. *Acta Theriologica*. 542:171–181. 2009.

MAACK, R. Breves notícias sobre a geologia dos estados do Paraná e Santa Catarina. Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, v. 2, art. 7, pp. 63-157. 1947.

MONTGELARD, C.; MATTHEE, A. C. Tempo of genetic diversification in southern African rodents: The role of Plio-Pleistocene climatic oscillations as drivers for speciation. Acta Oecologia. 42: 50–57. 2012.

MUSSER, G. G.; CARLETON, M. D. *Superfamily Muroidea*. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3. ed. Baltimore: John Hopkins University Press, v. 2, p. 894-1531, 2005.

NEI, M. Molecular Evolutionary Genetics. Columbia University Press, New York, NY, USA. 1987.

NEI, M.; JIN, L. Variances of the average numbers of nucleotide substitutions within and between populations. Molecular Biology and Evolution. 6(3): 290–300. 1989.

NYLANDER, J. A. A. Bayesian phylogenetics and the evolution of gall wasps. (MrModeltest v2). Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, ISSN 1104-232X; 937. 2004.

OLIVEIRA, J. A. Morphometric assessment of species groups in the South American rodent genus *Oxymycterus* (Sigmodontinae), with taxonomic notes base on the analysis of type material. Tese de doutorado, Texas Tech University, 320 p, 1998.

PAISE, G.; VIEIRA, E. M. Daily activity of a Neotropical rodent (*oxymycterus nasutus*): seasonal changes and influence of environmental factors. Journal of Mammalogy. August 2006, Vol. 87, No. 4, pp. 733-739. 2006.

PARADA, A.; PARDIÑAS, U. F. J.; *et al.* Dating na impressive Neotropical radiation: Molecular time estimates for the Sigmodontinae (Rodentia) provide insights into its historical biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution 66. 960-968. 2013.

PARDIÑAS, U. F.J.; D'ELIA, G.; ORTIZ, P. E. Sigmodontinos fósiles (rodentia, muroidea, sigmodontinae) de América del sur: estado actual de su conocimiento y prospectiva. Mastozoología Neotropical / *J. Neotrop. Mammal.* 9(2):209-252, 2002.

PATTERSON, B. e PASCUAL, R. The fossil mammal fauna of South America, p. 247-309. In: A. KEAST; F.C. ERK & B. GLASS (Eds). Evolution, mammals and southern continents. Albany, State University New York Press, 543p. 1972.

PILLAR, V, D.; (Org.); MÜLLER, S. C.; (Org.); CASTILHOS, Z. M. S.; (Org.); JACQUES, A. V. A. (Org.). Campos Sulinos: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade. 1. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, v. 1. 403p. 2009.

REIG, O. A. An assessment of the systematics and evolution of the Akodontini, with descrition of new fossil species of *Akodon* (Cricetidae, Sigmodontinae) In: Studies in

Neotropical Mammology. Essays in Honor of Philip Hershkovitz. Chicago: Fieldiana Zoology; pp. 347–399, 1987.

REIG, O. A. Distribuição geográfica e história evolutivas dos roedores Muroideos sulamericanos (Cricetidae: Sigmodontinae). *Revista Brasileira de Genética*. 7(2):333-365. 1984.

REIG, O. A. Teoría del origen y desarrollo de la fauna de mamíferos de América del Sur. *Monographiae Naturae Museo Municipal Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia* 1:1-161. 1981.

ROZAS, J.; LIBRADO, P.; SÁNCHEZ-DEL BARRIO, J. C.; MESSEGUER, X.; ROZAS, R. DnaSP Version 5 Help Contents [Help File]. Available with the program at <http://www.ub.edu/dnasp/>. 2010.

ROISENBERG, A.; VIERO, A. P. O vulcanismo mesozóico da Bacia do Paraná no Rio Grande do Sul. In: Holz & De Ros (2000). *Geologia do Rio Grande do Sul*. CIGO/UFRGS Porto Alegre, 444p. 2000.

SBALQUEIRO, I. J. Análises cromossômicas e filogenéticas em algumas espécies de roedores da Região Sul. Porto Alegre, Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1989.

SMITH, M. F. e PATTON, J. L. Phylogenetic relationships and the radiation of sigmodontine rodents in South America: evidence from cytochrome b. *Journal of Mammalian Evolution*. 6, 89–128. 1999.

SMITH, M. F.; PATTON, J. L. The diversification of South American murid rodents: evidence from mitochondrial DNA sequence data for the akodontine tribe. *Biological Journal of the Linnean Society*. 50:149-177. 1993.

TAJIMA, F. "Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism". *Genetics*. 123 (3): 585–95. 1989.

TAMURA, K.; PETERSON, D.; PETERSON, N.; STECHER, G.; NEI, M.; KUMAR, S. MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. *Molecular Biology and Evolution*. 28:2731–2739, 2011.

TOMAZELLI, L.J.; VILLWOCK, J. A. O Cenozóico no Rio Grande do Sul: Geologia da Planície Costeira. In: HOLZ M & DE ROS LF (Ed.). *Geologia do Rio Grande do Sul* IG/UFRGS, 375-406. 2000.

VENTURA, K.; SILVA M. J. J., GEISE, L.; LEITE, Y. L. R.; PARDIÑAS, U.F.J.; YONENAGA-YASSUDA, Y.; D'ELIA, G. The phylogenetic position of the enigmatic Atlantic forest-endemic spiny mouse *Abrawayaomys* (Rodentia: Sigmodontinae). *Zoological Studies*, 52:55. 2013.

VIEIRA, E.F. Rio Grande do Sul: geografia física e vegetação. Sagra, Porto Alegre. 1984.

## ANEXO I

Tabela 3. Lista de espécimes de *Oxymycterus nasutus* utilizados no presente estudo, incluindo: coleção de depósito, código de identificação. A localidade de cada amostra esta referenciada na tabela 2, listada de “a-z”. Siglas das coleções e Universidades depositadas estão a seguir. Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade de Blumenau (FURB).

Depósito	Referência	Localidade/Município	Estado	Latitude	Longitude
FURB	6249	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
FURB	6250	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
FURB	9365	Água Doce	SC	-26,997778	-51,555833
FURB	9825	Indaial	SC	-26,897778	-49,231944
FURB	9856	Água Doce	SC	-26,997778	-51,555833
FURB	15106	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15140	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	15154	Campo Belo do Sul	SC	-27,898889	-50,760833
FURB	18119	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	18153	São Domingos	SC	-26,557778	-52,531944
FURB	18228	Candói	PR	-25,570833	-52,052778
FURB	20520	Abdon Batista	SC	-27,610833	-51,022778
UFPR	P42	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P50	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P53	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P54	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P56	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P59	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P60	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P62	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P65	Piraquara	PR	-25,441944	-49,062778
UFPR	P76	Ponta Grossa/Vila Velha	PR	-25,095	-50,161944
UFPR	P86	Curitiba/Mata da Varzea	PR	-25,429722	-49,271944
UFPR	P87	Curitiba/Mata da Varzea	PR	-25,429722	-49,271944
UFPR	P124	São Mateus do Sul/Fazenda Durgo	PR	-25,873889	-50,382778
UFPR	P969	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P970	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P973	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P980	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P995	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1008	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1018	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1019	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1039	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1049	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1051	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1053	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1055	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1061	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFPR	P1099	São José dos Pinhais/Barro Preto	PR	-25,5799	-49,175373
UFRGS	ALV 16	APA Lagoa Verde- Rio Grande	RS	-32,139934	-52,181064
UFRGS	HL 11	Herval	RS	-32,023889	-53,395833
UFRGS	CAM 09	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 12	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 13	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 15	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 21	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	CAM 34	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 01	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 02	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 05	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 07	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 08	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 10	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	FQ 30	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 43	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 44	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 47	Camaquã	RS	-30,850833	-51,811944
UFRGS	FQ 63	Cristal	RS	-31,002778	-52,05
UFRGS	FQ 72	Cristal	RS	-31,002778	-52,05

UFRGS	GUA 04	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 05	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 06	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 07	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 12	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 13	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 17	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 18	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 19	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 20	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 21	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	GUA 22	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325
UFRGS	HFE 02	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 03	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 04	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	HFE 05	Erechim	RS	-27,633889	-52,273889
UFRGS	MEV 01	Mata Estrada Velha-Rio Grande	RS	-32,035	-52,098889
UFRGS	MEV 02	Mata Estrada Velha-Rio Grande	RS	-32,035	-52,098889
UFRGS	PL 17	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 44	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 200	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 201	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	PL 300	HBITL-Pelotas	RS	-31,771944	-52,342778
UFRGS	POS 18	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 20	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 25	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	POS 27	Pedro Osório-Ar. Moreira	RS	-31,863889	-52,822778
UFRGS	PRM 13	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	AS 17	Cambará do Sul <sup>1</sup>	RS	-29,191667	-50,0975
UFRGS	AS 05	Cambará do Sul <sup>1</sup>	RS	-29,191667	-50,0975
UFRGS	PRM 129	Pró-Mata/São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PRM 105	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	RIB 20	Barra do Ribeiro	RS	-30,290833	-51,300833
UFRGS	SLS 07	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 08	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 13	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 14	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	SLS 17	São Lourenço do Sul	RS	-31,365	-51,977778
UFRGS	PM 47	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 65	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 66	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 70	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 74	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 76	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 79	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 80	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 86	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 87	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 91	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 99	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 100	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	PM 104	Pró-Mata /São Francisco de Paula	RS	-29,550768	-50,276487
UFRGS	TAI 40	ESEC Taim- Rio Grande	RS	-32,7425	-52,574444
UFRGS	TAP 03	Tapes	RS	-30,72778	-51,395833
UFRGS	FQ 105	Guaíba	RS	-30,113889	-51,325

Legenda:

<sup>1</sup>Parque Nacional dos Aparados da Serra